

## KEANEKARAGAMAN KUPU-KUPU DI KAWASAN AIR TERJUN RAMPAH MENJANGAN, LOKSADO, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

### Diversity of Butterflies in Area of Rampah Menjangan Waterfall, Loksado, Hulu Sungai Selatan Regency

**Pahrian Noor \*, Dharmono, Muchyar**

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia

\*Surel korespondensi: pahriannoor3@gmail.com

**Abstract.** Rampah Menjangan Waterfall, Loksado is one of the wetlands area in the highland of Meratus. There was no data on butterflies inhabiting the area. This research aimed to count the diversity of butterflies. Data was collected systematically in 27 (50 m x 20 m) quadrant plots situated at the left and the right of river. The distance between a plot and another was 50 m. There were 13 butterfly species. The highest IVI (important value index) was *Jamides Alecto ageladas* (IVI = 24.57%), while the lowest one was *Troides mirandus* (IVI = 10.12%). The diversity index of butterflies was  $H' = 2.478$ .

**Keywords:** butterfly, diversity, value index, waterfall

#### 1. PENDAHULUAN

Air terjun Rampah Menjangan terletak di kaki Pegunungan Meratus, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Air Terjun Rampah Menjangan yang sesuai dengan Puspita, Ratnawati, Suryadiputra & Meutia (2005) dikategorikan lahan basah ini merupakan bagian dari aliran Sungai Uyit yang bermuara di Sungai Amandit.

Dari survei awal, kawasan air terjun ini dihuni sungai. Jarak antar-plot 50 m. Spesies kupu-kupu diidentifikasi dengan Borrer et al. (1992), Lilies (1991), Smart (1975), dan Soekardi (2007). Kemelimpahan dihitung dari Tujuan penelitian adalah mengukur kemelimpahan dan keanekaragaman kupu-kupu di Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan. Data dapat dimanfaatkan sebagai awal dalam pelestarian kupu-kupu atau pengelolaan habitat satwa liar.

#### 2. METODE

Data dikumpulkan langsung di sekitar Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan, Loksado melalui observasi pada 27 plot kuadran (50 x 20 m<sup>2</sup> per plot) yang diletakkan di sisi kiri dan kanan

indeks nilai penting (INP) yang rumusnya menurut Fachrul (2012) sebagai berikut.

kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki sisik di sayapnya yang mudah lepas jika terpegang, tidak menggigit atau menyengat dan serangga dewasa bukan merupakan serangga perusak (Suhara, 2009). Namun, sangat disayangkan habitat kupu-kupu mulai terganggu. Aktifitas masyarakat dalam bentuk pembukaan lahan baru melalui pembakaran mengganggu habitat asli kupu-kupu, sehingga diduga mengurangi jumlah dan jenis kupu-kupu di kawasan tersebut.

$$INP = FR + KR$$

Keragaman dihitung dengan indeks diversitas Shannon–Winner (Michael, 1994).

$$H' = -\sum p_i \ln p_i$$

Keterangan :

- 1)  $P_i$  = kemelimpahan proporsional;  $n$  = Jumlah individu suatu spesies;  $N$  = Jumlah total individu semua spesies
- 2)  $H'$  = nilai indeks keanekaragaman;  $H' > 3$  = keragaman spesies tinggi;  $H' 1 \leq H' \leq 3$  = keanekaragaman sedang;  $H' < 1$  = keanekaragaman rendah.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kemelimpahan Kupu-kupu

Ditemukan 13 spesies kupu-kupu di Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan. Spesies dengan indeks nilai penting tertinggi adalah *Jamides alecto ageladas* (INP = 24,571%), sedangkan terendah adalah *Troides mirandus* (INP = 10,119%) (Tabel 1).

Tabel 1. Kemelimpahan spesies kupu-kupu

Famili	Nama spesies	INP		
		Kiri	Kanan	Rerata
Acraeidae	<i>Acraea violae</i> Fab.	13,603	17,699	15,621
Danaidae	<i>Danaus eryx</i>	9,35	10,758	10,054
Lycanidae	<i>Jamides alecto ageladas</i>	24,82	24,322	24,571
Nymphalidae	<i>Hypolimnas bolina bolina</i>	8,928	15,386	12,157
Nymphalidae	<i>Ideopsis gaura</i>	16,297	14,947	15,625
Nymphalidae	<i>Neptis clinoides</i>	16,444	15,386	15,915
Papilionidae	<i>Papilio dialis</i>	14,32	19,574	16,946
Papilionidae	<i>Troides mirandus</i>	7,7914	12,447	10,119
Pieridae	<i>Appias libythea</i>	17,58	13,072	15,326
Pieridae	<i>Eurema hecabe</i>	24,381	17,886	21,134
Pieridae	<i>Junonia orithya</i>	12,044	12,447	12,246
Satyridae	<i>Callerebia scanda</i>	17,012	13,883	15,448
Satyridae	<i>Mycalesis visala phamis</i>	17,43	12,194	14,814

*Jamides alecto ageladas* pada Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan memiliki NP tertinggi. Spesies ini termasuk spesies yang penyebarannya luas. Menurut Carter (1992), *Jamides alecto ageladas* ini dapat hidup di daerah hutan dan juga perbukitan. Sebarannya mulai dari India, Srilanka, Burma, Malaysia, hingga Indonesia.



Gambar 1. *Jamides alecto ageladas* (Soekardi, 2007)

*Troides mirandus* pada kawasan penelitian memiliki NP terendah. Menurut Nakanishi, Jalil & Wahid (2004) makanan dari *Troides mirandus* adalah tumbuhan *Aristolochia* sp. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa tumbuhan ini sedikit ditemukan pada saat itu, hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan pada musim kemarau dan banyaknya terlihat tumbuhan yang mati. Sedikitnya makanan dari *Troides mirandus* ini diduga menjadi faktor yang menyebabkan sedikitnya

kemelimpahan *Troides mirandus* pada kawasan penelitian.



Gambar 2. *Troides mirandus* (Smart, 1975)

Kemelimpahan kupu-kupu di Kawasan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Suhara (2009), beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan kupu-kupu yaitu melimpahnya sumber makanan yang berupa ulat. Bila tumbuhan melimpah, maka semakin banyak pula ketersediaan makanan ulat. Distribusi makanan akan mempengaruhi ketersediaan kawasan dalam mencari makan, kondisi demikian akan mempengaruhi keberadaan kupu-kupu. Banyaknya nektar akan menyebabkan kupu-kupu mendatangi kawasan tersebut. Keberadaan predator aka mengancam keberadaan kupu-kupu. Selain itu kerusakan tumbuhan sebagai tempat berlindung juga merupakan ancaman bagi kupu-kupu. Kerusakan habitat kupu-kupu akan mengakibatkan terjadinya migrasi kupu-kupu tersebut dalam mencari habitat baru, misalnya longsor, kemarau, kebakaran, banjir dan sebagainya. Aktifitas manusia merupakan faktor penting yang menyebabkan kerusakan habitat kupu-kupu. Hal tersebut diduga merupakan penyebab utama terhadap penurunan dan bahkan kepunahan kupu-kupu. Hal inilah yang diduga mempengaruhi kemelimpahan kupu-kupu di kawasan ini.

#### 3.2 Keragaman Kupu-kupu

Indeks Keanekaragaman ( $H'$ ) kupu-kupu berdasarkan hasil penelitian adalah 2,478 (Tabel 2). Keanekaragaman kupu-kupu di kawasan ini termasuk didalam kategori sedang.

Menurut Jumar (2000), faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman kupu-kupu ini yaitu faktor dalam (yang dimiliki oleh serangga itu sendiri) dan faktor luar (yang berada di lingkungan sekitarnya). Faktor-faktor luar meliputi makanan dan faktor hayati yaitu gangguan dari organisme lain.

Makanan merupakan komponen utama yang digunakan serangga untuk hidup dan berkembangbiak. Penelitian dilakukan pada saat musim kemarau, saat sebagian tumbuhan di Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan banyak yang kering dan mati. Ini menyebabkan sedikitnya makanan bagi kupu-kupu. Kerusakan habitat akibat aktivitas manusia berpengaruh besar terhadap keanekaragaman kupu-kupu. Aktivitas manusia yang mengganggu pertumbuhan kupu-kupu di kawasan penelitian ini adalah pembukaan lahan untuk perkebunan serta lalu lalang masyarakat di jalur sekitar aliran sungai menuju Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan. Hal ini yang diduga menyebabkan keanekaragaman kupu-kupu di kawasan air terjun menjadi sedang.

Tabel 2. Indeks keanekaragaman kupu-kupu

No.	Nama spesies	Kiri	Kanan	Rerata
1	<i>Jamides alecto ageladas</i>	0,292	0,3	0,296
2	<i>Eurema hecabe</i>	0,26	0,222	0,241
3	<i>Papilio dialis</i>	0,193	0,23	0,211
4	<i>Callerebia scanda</i>	0,218	0,194	0,206
5	<i>Mycalesis visala phamis</i>	0,21	0,184	0,197
6	<i>Neptis clinoides</i>	0,21	0,184	0,197
7	<i>Appias libythea</i>	0,226	0,162	0,194
8	<i>Ideopsis gaura</i>	0,193	0,194	0,193
9	<i>Acraea violae Fab.</i>	0,163	0,204	0,183
10	<i>Hypolimnas bolina bolina</i>	0,128	0,184	0,156
11	<i>Junonia orithya</i>	0,152	0,15	0,151
12	<i>Danaus eryx</i>	0,115	0,137	0,126
13	<i>Troides mirandus</i>	0,101	0,15	0,125
	H'	2,496	2,46	2,478

Kelembaban udara di kawasan air terjun berkisar 58-74%, sedangkan kawasan penelitian Sulistio (2013) berkisar 62-78%. Menurut Suhara (2009), kelembaban merupakan salah satu faktor iklim yang penting bagi kehidupan kupu-kupu. Kupu-kupu pada dasarnya menyukai habitat dengan kelembaban tinggi, misalnya tepi sungai atau di bawah tegakan, gua yang lembab. Berdasarkan besaran parameter di lokasi penelitian, kelembaban udara bukan faktor pembatas.

Tabel 3. Hasil pengukuran parameter lingkungan di kawasan Air Terjun Rampah Menjangan, Loksado

Parameter dan Satuan	Kisaran	Pustaka
Kelembaban udara (%)	58-74	62-78*
Kecepatan angin (m/s)	0,1-2,1	0,62-2,13*
Intensitas cahaya (K. Lux)	1,23-5,78	3,04-8,18*
Ketinggian tempat (mdpl)	253-315	Tidak dijelaskan
Suhu udara (°C)	29-33	15-45 °C**

Keterangan : \*Sulistio (2013)  
\*\*Jumar (2000)

Hasil pengukuran terhadap kecepatan angin didapatkan 0,1-2,1 m/s, sementara penelitian Sulistio (2013) adalah 0,62-2,13 m/s, rentang kecepatan angin tidak jauh berbeda karena kupu-kupu menyukai tempat yang berangin sedang. Menurut Sulistyani, Rahayuningsih & Partaya (2014), kecepatan angin merupakan faktor menentukan keberadaan kupu-kupu di suatu tempat. Kecepatan angin yang rendah menyebabkan kupu-kupu lebih banyak hadir pada suatu kawasan. Sementara itu Jumar (2000) menyatakan, kecepatan angin membantu penyebaran kupu-kupu dan mempengaruhi kelembaban udara, kelembaban udara akan mempengaruhi penyebaran, aktifitas dan perkembangbiakan serangga yang salah satunya adalah kupu-kupu.

Hasil pengukuran intensitas cahaya di kawasan penelitian berkisar antara 1,23-5,78 K.lux sedangkan pada kawasan penelitian Sulistio (2013) berkisar 3,04 – 8,18 K.lux rentang yang didapatkan tidak jauh berbeda karena kupu-kupu menyukai tempat bercahaya atau siang hari untuk beraktivitas dan melakukan reproduksi. Menurut Soekardi (2007), kupu-kupu merupakan serangga yang aktivitasnya dilakukan pada siang hari. Pada malam hari kupu-kupu di bawah daun pohon untuk istirahat dan erindung. Kegiatan terbang dimulai sekitar pukul 6.00 pagi hari, pada saat itu kupu-kupu terbang dalam jarak pendek dan merentangkan sayapnya untuk mendapatkan sinar matahari. Semakin siang aktifitas kupu-kupu dalam melakukan aktivitas untuk mendapatkan makanan ataupun untuk melakukan reproduksi.

Berdasarkan pengukuran parameter lingkungan diketahui bahwa ketinggian tempat kawasan penelitian berkisar antara 253-315 mdpl. Ketinggian tempat bukan menjadi faktor pembatas bagi kupu-kupu selama masih ada tumbuhan yang dapat hidup. Menurut Suhara (2009), faktor penting bagi kupu-kupu adalah ketersediaan nektar yang dapat dihisapnya. Kehadiran kupu-kupu ditentukan oleh ketersediaan cairan nektar ditunjukkan oleh kelimpahan tumbuhan berbunga yang menghasilkan nektar.

Hasil pengukuran suhu udara diketahui bahwa suhu udara di kawasan penelitian berkisar antara 29-33 °C. Menurut Jumar (2000) suhu yang efektif bagi kupu-kupu adalah berkisar antara minimum 15 °C, optimum 25 °C dan maksimum 45 °C diluar dari pada kisaran suhu ini kupu-kupu dapat kedinginan dan kepanasan hal ini mempengaruhi aktivitas



kupu-kupu. Hal ini berarti suhu bukan merupakan faktor pembatas pertumbuhan kupu-kupu.

#### 4. SIMPULAN

Kupu-kupu ditemukan di Kawasan Air Terjun Rampah Menjangan Loksado berjumlah 13 ekor. Kemelimpahan tertinggi dimiliki oleh *Jamides alecto ageladas*, sedangkan terendah adalah *Troides mirandus*. Status keanekaragamannya adalah sedang.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diberikan kepada BKSDA HSS memberikan perizinan kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Borror, D.T., Charles, A. & Jhonson, F. (1992). *Pengrnalan Pelajaran Serangga Edisi Keenam*. Yogyakarta: UGM press.  
Carter, D. (1992). *Butterflies And Moths*. London: Dorling Kinderslay Limited.

Jumar. 2000. *Entomologi Pertanian*. Jakarta: Rineka Cipta.  
Lilies, C. (1991). *Kunci Determinasi Serangga*. Yogyakarta: Kanisius.  
Michael, P. 1994. *Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.  
Nakanishi, A., Jailil, F.M. & Wahid, N. (2004). *Catalogue of Swallowtail Butterflies (Lepidoptera: Papilionidae) at Borneensis. BBEC Publication No. 24*. Kinabalu, Malaysia: ITBC Universiti Malaysia Sabah.  
Puspita, L., Ratnawati, E., Suryadiputra, I.N.N. & Meutia, A.A (2005). *Lahan Basah Buatan di Indonesia*. Bogor: Wetlands International Indonesia Programme.  
Smart, P. (1975). *The Illustrated Encyclopedia of The Butterfly Word*. Inggris: Salamender Books.  
Soekardi, H. (2007). *Kupu-Kupu di Kampus Unila*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.  
Suhara. (2009). *Ngengat Dan Kupu-Kupu*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.  
Sulistio. 2013. *Kemelimpahan dan Pola Distribusi Kupu-Kupu di Tepian Sungai Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.  
Sulistiyani, T.H., Rahayuningsih, M. & Partaya (2014). *Keanekaragaman jenis kupu-kupu (Lepidoptera: Rhopalocera) di Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung Kabupaten Batang*. *Unnes J Life Sci* 3(1).

----