

Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Racun Ayam (*Brucea javanica* [L.] Merr.) Asal Kalimantan Selatan

by Sutomo Sutomo

Submission date: 04-Feb-2023 11:25AM (UTC+0800)

Submission ID: 2005974092

File name: eri_Ekstrak_Etanol_Daun_Racun_Ayam_Brucea_javanica_L._Merr..pdf (453.76K)

Word count: 3022

Character count: 17558

**SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI
EKSTRAK ETANOL DAUN RACUN AYAM (*Brucea javanica* [L.] Merr.)
ASAL KALIMANTAN SELATAN**

Sutomo^{1*}, Fahriah¹, Arnida²

¹Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat

²Pusat Studi Obat Berbasis Bahan Alam Universitas Lambung Mangkurat

*Email: sutomo01@ulm.ac.id

Artikel diterima: 29 September 2020; Disetujui: 16 Maret 2021

DOI: <https://doi.org/10.36387/jiis.v6i1.607>

ABSTRAK

Tumbuhan racun ayam adalah salah satu tumbuhan yang buahnya memiliki beberapa aktivitas salah satunya adalah sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun racun ayam. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri *S. aureus*, *E. coli*, dan *P. aeruginosa* dengan metode difusi cakram pada konsentrasi 80, 100, dan 120 ppm. Hasil penelitian diperoleh ekstrak etanol daun *B. javanica* memiliki zona hambat paling besar pada *E. coli* dengan nilai diameter zona hambat pada 80, 100, 120 ppm yaitu 11,7mm, 14,5 mm dan 19,67 mm. Zona hambat pada *S. aureus* hanya terlihat pada konsentrasi 100 dan 120 ppm dengan diameter zona hambat 1,17 mm dan 2,17 mm, sedangkan pada *P. aeruginosa* tidak memiliki nilai zona hambat. Hasil analisis statistik yaitu menunjukkan signifikansi nilai diameter zona hambat pada bakteri *E. coli* mulai 80 ppm dengan nilai sig 0,034 karena sig <0,05 maka berbeda signifikan dengan kontrol negatif. Bakteri *S. aureus* yang memiliki nilai sig <0,05 hanya pada 100 ppm dan 120 ppm. Bakteri *P. aeruginosa* memiliki nilai sig >0,05 yaitu tidak berbeda signifikan terhadap semua konsentrasi.

Kata kunci: Cakar ayam; *Brucea javanica*; Skrining; Ekstrak; antibakteri

5 **ABSTRACT**

Racun ayam is one of the plants which has several activities in its fruits, one of which is an antibacterial. This study aims to determine the antibacterial activity of ethanol extract of racun ayam leaves. The extraction was done by maceration method using ethanol as a solvent. Antibacterial activity assay was carried out on S. aureus, E. coli, and P. aeruginosa bacteria by disk diffusion method at the concentrations of 80, 100, and 120 ppm. The results showed that the ethanol extract of B. javanica leaves had the greatest inhibition zone on E. coli with inhibition zone diameter values at 80, 100, and 120 ppm were 11.7 mm, 14.5 mm and 19.67 mm respectively. Inhibition zones in S. aureus could only be seen at 100 and 120 ppm which had inhibition zone diameters at 1.17 mm and 2.17 mm respectively, whereas in P. aeruginosa they did not have any inhibitory zone values. The results of

statistical analysis showed a significance of the inhibition zone diameter values of *E. coli* bacteria starting at 80 ppm with a sig value of 0.034. Due to a sig value was <0.05, it was categorized as significantly different from the negative control. The bacteria of *S. aureus* which had <0.05 for sig values only found on 100 ppm and 120 ppm. Bacteria *P. aeruginosa* which had sig value >0.05 was not significantly different at all concentrations.

Keywords: *Cakar ayam; Brucea javanica; screening; extract; antibacterial*

PENDAHULUAN

Racun ayam (*Brucea javanica* [L.] Merr.) merupakan salah satu tumbuhan obat tradisional dalam pengobatan penyakit infeksi. Buah masak *B. javanica* yang telah dikeringkan banyak digunakan untuk mengobati penyakit infeksi pada saluran pencernaan dan lainnya (WHO, 1999). Daun dari *B. javanica* secara empiris telah digunakan suku Dayak Meratus untuk mengobati penyakit kulit seperti kurap dan gatal-gatal. Aktivitas antibakteri dari sari buah tumbuhan ini juga telah dibuktikan pada beberapa bakteri seperti *Salmonella*, *Shigella*, dan *Vibrio cholerae* spp (Sornwatana *et al.*, 2013).

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak dialami oleh penduduk Indonesia. Penyebab dari infeksi tersebut adalah mikroba patogen seperti bakteri (Radji, 2011). Bakteri adalah

mikroorganisme bersel tunggal dengan ukuran panjang 0,5-10 μm dan lebar 0,5-2,5 μm (Arisandi *et al.*, 2017). Jenis bakteri patogen yang sering menyebabkan infeksi yaitu bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Pseudomonas aeruginosa* (Gibson, 1996 ; Djide & Sartini, 2008). Bakteri *S. aureus* adalah gram positif berbentuk kokus, sedangkan bakteri *P. aeruginosa* dan bakteri *E. coli* merupakan gram negatif (Kayser *et al.*, 2005; Melliawati, 2009; Pelcjar, 2008). *S. aureus* dapat menyebabkan infeksi pada kulit dan jaringan lunak seperti *pneumonia, osteomyelitis, meningitis*, dan *endocarditis*. *E. coli* merupakan flora normal pada saluran pencernaan tubuh manusia namun dapat menjadi patogen apabila berpindah dari habitat normalnya (Bartlett *et al.*, 2010 ; Melliawati, 2009). *S. aureus* diketahui telah resisten terhadap beberapa antibiotik antara lain

golongan β laktamase, metisilin, nafsilin, oksasilin, dan vankomisin, sedangkan *P. aeruginosa* resisten paling tidak terhadap 3-antimikroba yaitu kelas β -laktam, carbapenem, dan aminoglikosida (Sari, 2012; Jawetz *et al.*, 2008).

Banyaknya resistensi bakteri terhadap antibiotik memacu peneliti untuk menemukan obat baru dari bahan alam. Seperti yang telah diketahui tumbuhan *B. javanica* telah banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk penyakit infeksi dan penyakit lainnya. Telah banyak penelitian mengenai buah dan biji dari tumbuhan tersebut namun masih terbatas untuk bagian daunnya. Peneliti tertarik untuk melakukan skrining fitokimia dan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun *B. javanica* terhadap penghambatan bakteri *S. aureus*, *E. coli*, dan *P. aeruginosa*.

³ **METODE PENELITIAN**

Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru serta Balai

Riset dan Standardisasi Industri (Baristan) Banjarbaru.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi *autoclave* Tomy (sx-500), alat-alat gelas (Pyrex, Iwaki), bejana maserasi, bunsen, cawan petri, cawan porselin, inkubator (Memmert), *laminary air flow* (Daihan Labtech), lemari steril (Ellitech), oven (Thermoline), timbangan analitik (AND GF 3000), lemari pengering (Lokal), pinset, propipet, rak tabung, stamper, jangka sorong, *waterbath* (Memmert).

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu daun *B. javanica*., aquades, etanol 96%, kertas saring Whatman 42, pereaksi *Dragendorff*, *Mayer*, *Liebermann-Buchard*, HCl, kloroform, asam asetat glasial, gelatin, asam sulfat, barium klorida, *Nutrient Agar* (NA), siprofloksasin, biakan bakteri *S. aureus* ATCC 25923, *E. coli* ATCC 25929 dan *P. aeruginosa* ATCC 9027 koleksi Laboratorium Baristan.

Determinasi Tumbuhan

Tumbuhan *B. javanica* dilakukan *determinasi* di Kebun Raya Banua (KRB) Banjarbaru.

Pengambilan dan Pengolahan Sampel

Preparasi dimulai dari pengumpulan sampel yang diambil dari KRB Banjarbaru berupa daun *B. Javanica* yang sudah dewasa, dilakukan sortasi basah dengan memilih bagian daun yang segar dan tidak rusak. Daun dicuci dengan menggunakan air mengalir dan dikeringkan dalam lemari pengering suhu 50°C. Dilakukan sortasi kering dan diperkecil ukurannya menjadi serbuk kasar (mesh 14).

Pembuatan Ekstrak Etanol daun *Brucea javanica*

Sampel dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Sebanyak 750 gram serbuk daun *B. javanica* ditimbang dan ditambahkan etanol 96% (Perbandingan 1 : 17 b/v) dan dilakukan 3 kali replikasi. Setiap 1 x 24 jam cairan penyari disaring dan diganti dengan yang baru. Ekstrak diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 60°C. Ekstrak tersebut kemudian dikentalkan di atas waterbath dengan suhu 60°C hingga didapatkan bobot tetap. Rendemen yang diperoleh dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{bobot ekstrak (g)}}{\text{bobot sampel kering(g)}} \times 100\%$$

Uji kualitatif pelarut pada ekstrak

Ekstrak etanol ditimbang 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 mL larutan KMnO₄ dan 5 tetes H₂SO₄ 2 N. Tidak munculnya warna kuning kecoklatan pada sampel menandakan tidak adanya kandungan alkohol pada sampel (Kemenkes RI, 2014).

Skrining fitokimia

1. Uji flavonoid, alkaloid, tanin, dan fenolik

Ekstrak kental yang telah dilarutkan dalam etanol pa ditambahkan serbuk Mg dan HCl pekat untuk uji flavonoid, pereaksi Mayer dan Dragendorff untuk uji alkaloid, larutan gelatin 5 mL 1% untuk uji tanin, 3 tetes FeCl₃ 2% untuk uji fenolik. Terbentuknya warna orange, merah, atau kuning dinyatakan positif mengandung flavanoid (Depkes RI, 2008). Pereaksi Mayer memberikan endapan putih dan pereaksi Dragendorff memberikan endapan berwarna jingga menunjukkan adanya alkaloid (Prameswari &

Widjanarko, 2014). Adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Terbentuknya warna menjadi hijau, merah, biru atau biru tua menunjukkan adanya senyawa fenolik (Harborne, 1987)

2. Uji saponin

Uji saponin dilakukan dengan menimbang ekstrak 5 mg ditambahkan aquades 10 mL dan dikocok kuat-kuat. Terbentuknya busa yang stabil menunjukkan adanya senyawa saponin (Savithramma *et al.*, 2011).

3. Uji steroid/triterpenoid

Ekstrak kental yang telah dilarutkan dalam kloroform ditambahkan 2 mL asam asetat anhidrat dan 2 mL H₂SO₄ pekat melalui dinding tabung. Terbentuknya warna biru atau hijau menunjukkan adanya steroid dan jika terbentuk warna ungu-merah adanya triterpenoid (Harborne, 1987).

²
Pembuatan standar kekeruhan larutan (larutan Mc Farland)

Larutan H₂SO₄ 0,36 N sebanyak 99,5 mL dicampurkan dengan larutan BaCl₂.2H₂O 1,175%

sebanyak 0,5 mL. Campuran dikocok sampai terbentuk larutan yang keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai standar kekeruhan suspensi bakteri uji dan digunakan tidak lebih dari 15 menit (Victor, 1980).

Pembuatan suspensi bakteri uji

Bakteri uji yang telah diinokulasi diambil dengan ose steril lalu disuspensikan ke dalam tabung yang berisi 2 mL larutan NaCl 0,9% hingga di peroleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan Mc. Farland. Perlakuan yang sama dilakukan pada setiap jenis bakteri uji (Mpila *et al.*, 2018).

¹
Pembuatan larutan Na-CMC

Larutan Na-CMC 0,5% dibuat dengan cara menimbang 500 mg serbuk Na-CMC dan melarutkan dengan aquades panas suhu 70°C. Serbuk Na-CMC dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai larutan berwarna bening. Larutan diencerkan dengan aquadest dalam labu ukur hingga 100 mL (Mpila *et al.*, 2018).

²
Pembuatan larutan kontrol positif

Kontrol positif dibuat menggunakan tablet Ciprofloxacin 500 mg. Tablet digerus dan dibuat

larutan 100 ppm dengan cara melarutkan 1 mg ciprofloxacin dan dilarutkan dalam larutan Na-CMC 0,5% 10 mL. Larutan diencerkan menjadi 50 ppm dengan cara mengambil 5 mL larutan 100 ppm dan ditambahkan Na-CMC 0,5% hingga 10 mL (Prasdiyanti, 2018).

Pembuatan larutan uji

Larutan stok dengan konsentrasi 120 ppm dibuat dengan cara menimbang 12 mg ekstrak dan dilarutkan dalam 100 mL Na-CMC 0,5%. Dari larutan stok tersebut dilakukan pengenceran untuk mendapatkan larutan uji 100 ppm dan 80 ppm (Mpila *et al.*, 2018).

Pembuatan media uji

Media uji dibuat dengan menimbang 1,8 gram *Nutrient Agar* (NA), lalu dilarutkan dalam 90 mL aquades (20 g/1000 mL). Media dihomogenkan dengan stirer di atas penangas air sampai mendidih. Media disterilkan dalam *autoclave* pada suhu 121°C selama 15 menit, kemudian didinginkan sampai suhu ± 45-50°C. Media dimasukkan ke dalam cawan petri sebanyak 15 mL per cawan (Mpila *et al.*, 2018).

8 **Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun *Brucea javanica***

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan difusi cakram menggunakan media agar yang diolesi suspensi bakteri uji dan diletakkan kertas cakram yang sudah dicelupkan larutan ekstrak. Ekstrak etanol daun *B. javanica* konsentrasi 80 ppm, 100 ppm, 120 ppm, kontrol positif dan kontrol negatif ppm dimasukkan pada cawan petri pertama, kedua dan ketiga dengan 4 titik melingkar dan 1 titik di bagian tengah. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam. Pengamatan penghambatan dilakukan setelah 1 x 24 jam masa inkubasi (Vandepitte *et al.*, 2005).

Analisis Data

Apabila konsentrasi yang diberikan memiliki daya hambat yang besar maka akan menimbulkan angka diameter zona hambat yang besar pula (Davis & Stout, 1971). Adapun rumus untuk menghitung zona hambat yaitu :

$$\text{Zona hambat} = \frac{d_1 + d_2}{2} - X$$

Keterangan :

d1 = Diameter vertikal zona bening pada media (mm)

d2 = diameter horizontal zona bening pada media (mm)

X = Diameter cakram (6 mm)

Kategori hasil luas zona hambat yaitu >20 mm dikategorikan sangat kuat, 11-20 mm dikategorikan kuat, 6-10 mm dikategorikan sedang dan <5 mm dikategorikan lemah (Susanto *et al.*, 2012). Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata zona hambat dan analisis program SPSS untuk mengetahui signifikansi pada masing-masing perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstraksi

Dari 750 g serbuk simplisia yang diekstraksi didapatkan ekstrak kental sebanyak 237,15 g (31,62%). Ekstrak berwarna hijau tua dengan rasa agak pahit.

Tabel 2. Hasil diameter rata-rata zona hambat dan standar deviasi ekstrak etanol 96% daun *B. javanica* terhadap bakteri *S. aureus*, *E. coli*, dan *P. aeruginosa*

Bakteri	Diameter Zona Hambat (mm) (x ± SD)				
	80 ppm	100 ppm	120 ppm	K(+)	K(-)
<i>S. aureus</i>	0 ± 0	1,17 ± 0,28	2,17 ± 1,25	24,67 ± 1,15	0 ± 0
<i>E. coli</i>	11,17 ± 0,57	14,5 ± 1,32	19,67 ± 1,60	27,5 ± 1,73	0 ± 0
<i>P. aeruginosa</i>	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	26,67 ± 0,57	0 ± 0

Penentuan Diameter Zona Hambat

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa dengan konsentrasi yang sama diameter zona hambat paling besar terdapat pada bakteri *E. coli* (kategori kuat), diikuti

10
Tabel 1. Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol 96% daun *B. javanica*

No	Uji	Hasil
1.	Alkaloid	(-)
2.	Flavonoid	(+)
3.	Tannin	(-)
4.	Fenolik	(+)
5.	Steroid	(+)
6.	Triterpenoid	(-)
7.	Saponin	(+)

Keterangan


(+): Mengandung senyawa uji

(-) : Tidak mengandung senyawa uji

Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder dalam ekstrak etanol daun *B. javanica*, dimana beberapa metabolit sekunder berpotensi sebagai antibakteri. Hasil skrining fitokimia disajikan pada Tabel 1.

bakteri *S. aureus* (kategori lemah), dan pada bakteri *P. aeruginosa* tidak memiliki zona hambat konsentrasi. Hasil diameter rata-rata zona hambat terhadap bakteri uji, kontrol positif, dan kontrol negatif dapat dilihat pada



Gambar 1. Hasil diameter rata-rata zona hambat ekstrak etanol 96% daun *B. javanica* terhadap bakteri *S. aureus*, *E. coli*, dan *P. aeruginosa*

Analisis dengan Uji SPSS

Analisis statistik terhadap ketiga bakteri uji yaitu analisis statistik meliputi uji normalitas dan uji homogenitas serta uji lanjutan dengan uji Mann Whitney. Pada bakteri *S. aureus* pada konsentrasi 100 ppm dengan nilai rata-rata 1,17 mm memiliki nilai sig 0,043 dengan kontrol positif. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi daya hambat minimum untuk uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun *B. javanica* terhadap bakteri *S. aureus* yaitu pada 100 ppm dengan nilai rata-rata 1,17 mm berbeda signifikan terhadap kontrol positif jauh lebih lemah dimana pada konsentrasi 20 ppm menghasilkan diameter zona hambat 24,67 mm. Pada bakteri *E. coli* pemberian sampel pada konsentrasi 100 dan 120 ppm memiliki aktivitas yang signifikan

terhadap kontrol negatif, sedangkan pada konsentrasi 80 ppm belum signifikan. Namun hasil aktivitas antibakteri terhadap bakteri *E. coli* hingga konsentrasi 120 ppm masih belum sebanding dengan kontrol positif konsentrasi 20 ppm. Untuk bakteri *P. aeruginosa* yang diberikan pada konsentrasi 80, 100, dan 120 ppm tidak berbeda signifikan dengan kontrol negatif dan berbeda signifikan dengan kontrol positif. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun *B. javanica* tidak memiliki aktivitas terhadap bakteri *P. aeruginosa*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Hasil skrining fitokimia yaitu ekstrak etanol daun racun ayam

memiliki kandungan saponin, fenolik, steroid, dan flavonoid.

2. Hasil penelitian diperoleh ekstrak etanol daun *B. javanica* memiliki zona hambat paling besar pada *E. coli* dengan nilai diameter zona hambat pada 80, 100, 120 ppm yaitu 11,7mm, 14,5 mm & 19.67 mm. Zona hambat pada *S. aureus* hanya terlihat pada konsentrasi 100 dan 120 ppm dengan diameter zona hambat 1,17 mm dan 2,17 mm, sedangkan pada *P. aeruginosa* tidak memiliki nilai zona hambat.

5 UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada LPPM ULM dan Kebun Raya Banua atas semua Suport dalam penelitian, laboratorium farmasi ULM serta Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, A., B. Tamam & R. Yulian. 2017. Jumlah Koloni pada Media Kultur Bakteri yang Berasal dari Thallus dan Perairan Sentra Budidaya *Kappaphycus* di Sumenep Alvarezii. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 9 : 57-64.
- Bartlett., Allison., Hulten & G. Kristina. 2010. *Staphylococcus aureus* Pathogenesis Secretion Systems, Adhesins, and Invasins. *The Pediatric Infectious Disease*. 9 : 860-861.
- Davis, W.W & Stout, T.R. 1971. Disc Plate Methods of Microbiological Antibiotic Assay. *Microbiology*. 4 : 659-665.
- Depkes RI. 2008. *Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Djide & Sartini. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lepas, Makasar.
- Gibson, J. M. 1996. *Mikrobiologi dan Patologi Modern Untuk Perawat*. EGC, Jakarta.
- Harborne, J. B. 1987. *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Penerbit ITB, Bandung
- Jawetz, E., J. L. Melnick & E. A. Adelberg. 2008. *Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi Ke-23. EGC, Jakarta.
- Kayser, F., K. Bienz., J. Eckert & R. Zinkernagel. 2005. *Color Atlas of Medical Microbiology*, New York.
- Kemenkes RI. 2014. *Farmakope Herbal Indonesia Edisi I*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Melliawati, R. 2009. *Escherichia coli* dalam Kehidupan Manusia. *Biotrends*. 4 : 10-14.
- Mpila, D., F. Fatimawali & W. Wiyono. 2018. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mayana (*Coleus*

- Atropurpureus* [L] Benth)
Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia Coli* Dan *Pseudomonas Aeruginosa* Secara In-Vitro. *Pharmakon*.
- Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi, Terjemahan oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk.* Universitas Indonesia: Jakarta.
- Prameswari, O. M & S. B. Widjanarko. 2014. Uji Efek Ekstrak Air Daun Pandan Wangi terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Histopatologi Tikus Diabetes Mellitus. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*. 2: 16-27.
- Prasdiyanti, N. C. 2018. *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi dari Ekstrak Kloroform Daun Piper crocatum Ruiz & Pav. terhadap Staphylococcus aureus Resisten Ampicillin.* Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Radji, M. 2011. *Mikrobiologi*. Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
- Sari, N. I. 2012. *Pseudomonas aeruginosa, Penyebab Infeksi Nosokomial.* Fakultas Sains dan Teknologi UAI
- Savithramma, N., M. L. Rao & D. Suhrulatha. 2011. Screening of Medicinal Plants for Secondary Metabolites. *Middle-East Journal of Scientific Research*. 8 : 79-584.
- Susanto, D., Sudrajat & R. Ruga. 2012. Studi Kandungan Bahan Aktif Tumbuhan Meranti Merah (*Shorea leprosula* Miq) sebagai Sumber Senyawa Antibakteri. 2 : 1-5.
- Sornwatana, T., Roytrakul, S., Wetprasit, N & Ratanapo, S. 2013. Brucin, an antibacterial peptide derived from fruit protein of fructus Bruceae, *Brucea javanica* (L.) Merr. *Soc Appl Microbiol*. 2 :129–36.
- Vandepitte. 2005. *Prosedur Laboratorium Dasar untuk Bakteriologis Klinis. Edisi 2.* Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Victor, L. 1980. *Antibiotics in Laboratory Test.* The Williams and Wilkins Company, USA.
- World Health Organization. 1999. WHO monographs on selected medicinal plants Radixglycyrrhizae. *Essent Med Heal Prod Inf Portal*. 1:183–94.

Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Racun Ayam (*Brucea javanica* [L.] Merr.) Asal Kalimantan Selatan

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.ubaya.ac.id 5%
Internet Source

2 ejournal.unsrat.ac.id 5%
Internet Source

3 eprints.ulm.ac.id 1%
Internet Source

4 Esterlina Aldora Puluh, Hosea Jaya Edy, Jainer Pasca Siampa. "Uji Antibakteri Sediaan Masker Peel Off Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis* sebagai Antijerawat", Jurnal MIPA, 2019 1%
Publication

5 repository.uhamka.ac.id 1%
Internet Source

6 ejournal.seminar-id.com 1%
Internet Source

7	Submitted to Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Student Paper	1 %
8	ojs.uho.ac.id Internet Source	1 %
9	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1 %
10	Maharadingga Maharadingga, Ani Pahriyani, Desilva Arista. "Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Daun Ketapang (<i>Terminalia catappa</i> L.) Pada Hamster Syrian Jantan Hiperglikemia Dan Hiperkolesterolemia Dengan Parameter Pengukuran Kolesterol Total Dan LDL", <i>Lambung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian</i> , 2021 Publication	1 %
11	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1 %
13	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1 %
14	Adudin H Henaulu, Martha Kaihena. "Potensi Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kecipir (<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC) Terhadap Pertumbuhan <i>Escherichia coli</i> dan	1 %

Staphylococcus aureus In Vitro", Biofaal Journal, 2020

Publication

15

Submitted to Universitas Mataram

Student Paper

1 %

16

snllb.ulm.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On