

# KERAGAMAN DAN KEKERABATAN GENETIK *GARCINIA* BERDASARKAN KANDUNGAN SENYAWA BIOAKTIF DAN AKTIVITAS BIOLOGISNYA: KAJIAN IN SILICO

[Genetic Diversity and Relationship of *Garcinia* Based on Bioactive Compounds and Their Biological Activities: *In Silico* Study]

Dindin Hidayatul Mursyidin<sup>\*</sup>✉, dan Fajar Nurrahman Maulana

Laboratorium Genetika dan Biologi Molekuler, FMIPA Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714  
email : dindinhm@gmail.com

## ABSTRACT

*Garcinia*, belongs to the Clusiaceae family, is a very prospective plant for development. Because of apomixis, however, this plant has a narrow genetic diversity. This study aims to determine the genetic diversity and relationships of *Garcinia* based on the content of bioactive compounds and its biological activities, using *in silico* approach. A total of 64 *Garcinia* species were analyzed by a multivariate method using the MVSP ver. 3.1 software. The results showed that based on these characters, *Garcinia* had a low (narrow) genetic diversity, with a Shannon index of 0.28. However, the xanthone, antifungal activity, and leaf organ are the three of *Garcinia* characters with a high (wide) genetic diversity. The PCA revealed that these characters are contributed positively to this genetic diversity. The UPGMA analysis also revealed that this germplasm is divide into six main clusters, where the fifth is the largest (53 species). The farthest relationship is shown by *G. hanburyi* and *G. cylindrocarpa*, as well as *G. bancana* and *G. excavata*, at a coefficient of 0.54. In this case, *G. mangostana*, the most popular species of *Garcinia*, has the closest relationship with *G. wightii* at a coefficient of 0.87, and farthest to *G. cylindrocarpa*. This information might be valuable in supporting the preservation and breeding programs of *Garcinia* in Indonesia, particularly for parental selection in the development of superior cultivars.

**Key words:** Bioactive compound, *Garcinia*, Genetic diversity, *In silico*

## ABSTRAK

*Garcinia* merupakan tumbuhan, termasuk familia Clusiaceae, yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Namun karena bersifat apomiks, tumbuhan ini memiliki keragaman genetik sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya secara *in silico*. Sebanyak 64 spesies *Garcinia* telah dianalisis secara multivariate menggunakan software MVSP ver. 3 untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetiknya berdasarkan karakter tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Garcinia* memiliki rentang keragaman genetik rendah (sempit), dengan rerata indeks Shannon sekitar 0,28, baik berdasarkan kandungan senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan organ yang menghasilkan senyawa bioaktif tersebut. Namun demikian, senyawa xanton, aktivitas antifungi dan organ daun adalah tiga karakter *Garcinia* yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (luas). Hasil analisis PCA, memperlihatkan bahwa ketiga karakter tersebut berkontribusi positif terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Hasil analisis kluster membagi 64 spesies *Garcinia* kedalam enam kluster utama, yang didalamnya kluster kelima adalah kelompok terbesar dengan jumlah anggota sebanyak 53 spesies. Pada penelitian ini, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs *G. excavata*, pada koefisien 0,54. Sementara itu, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Informasi ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian dan pemuliaan *Garcinia* di Indonesia, terutama seleksi tetus untuk perakitan kultivar unggul.

**Kata kunci:** Keragaman genetik, *Garcinia*, *In silico*, Senyawa bioaktif

## PENDAHULUAN

*Garcinia* merupakan tumbuhan, termasuk familia Clusiaceae, yang sangat prospektif untuk dikembangkan (Murthy *et al.*, 2019). Hal ini karena hampir seluruh bagian (organ) tubuhnya, seperti buah, kulit buah, akar, batang, dan daun dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, termasuk obat-obatan (Murthy *et al.*, 2018). Sebagai contoh, buah manggis (*Garcinia mangostana*), ‘Malabar tamarind’ atau *brindle berry* (*G. gummi-gutta*) dan ‘kokum’ (*G. indica*), selain dapat langsung dimakan (*edible fruits*) karena memiliki rasa yang lezat,

mengandung pula sejumlah nutrien, mineral dan vitamin penting, serta serat pangan yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman (Murthy *et al.*, 2019). Disamping itu, kulit buah ketiga spesies tersebut dilaporkan menghasilkan sejumlah senyawa bioaktif dengan aktivitas biologis penting, seperti antibakteri (Fouotsa *et al.*, 2015), antikanker (Murthy *et al.*, 2019), sitotoksik (Sukandar *et al.*, 2018), anti-inflamasi (Chen *et al.*, 2010), dan antioksidan (Aravind *et al.*, 2016), serta antivirus (Yang *et al.*, 2015). Bahkan sejak ribuan tahun lalu, kulit buah

\*Kontributor Utama

\*Diterima: 20 Mei 2020 - Diperbaiki: 7 September 2020 - Disetujui: 27 Oktober 2020

ketiga tumbuhan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di wilayah Asia, sebagai bahan ramuan dalam pengobatan tradisional (Murthy *et al.*, 2019).

Saat ini, manggis (*G. mangostana*), ‘Malabar tamarind’ (*G. gummi-gutta*) dan ‘kokum’ (*G. indica*) adalah tiga spesies *Garcinia* yang paling populer dan sangat intensif dikembangkan (Murthy *et al.*, 2018). Namun demikian, ketiga spesies tersebut bersifat apomiks dan agamospermi (perkembangan buah dan bijinya terjadi tanpa melalui fusi gamet), sehingga memiliki keragaman genetik sempit. Disamping itu, ketiganya juga memiliki keterbatasan, diantaranya: (a) kualitas buah yang rendah, (b) karakteristik pohon yang kurang menarik, (c) kurang toleran terhadap kekeringan, serta (d) batang bawahnya mudah terserang hama atau penyakit (Murthy *et al.*, 2018). Menurut Widiastuti *et al.* (2010), eksplorasi dan karakterisasi plasma nutfah adalah dua kegiatan utama yang dapat dilakukan untuk mendukung perluasan genetik (pemuliaan) suatu plasma nutfah. Khusus di Indonesia, tercatat sebanyak 64 spesies *Garcinia* (Uji, 2007), dari sekitar 300 spesies yang ada di dunia (Hemshekhar *et al.*, 2011), yang dapat digunakan dalam program pemuliaan. Berdasarkan jumlah tersebut, 25 spesies *Garcinia* terdapat di Kalimantan, 22 spesies masing-masing di Sumatera dan Sulawesi, adapun sisanya di pulau-pulau lain, seperti Jawa, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua (Uji, 2007).

Acquaah (2012) menambahkan bahwa analisis keragaman dan kekerabatan genetik juga diperlukan untuk mendukung program perluasan genetik (pemuliaan). Menurut Frankham *et al.* (2004), keragaman genetik dapat diukur melalui beberapa pendekatan, seperti variasi morfologis atau kuantitatif, sitologis atau pengaruh kehilangan alel yang terlihat secara langsung, serta variasi biokimia, termasuk variasi pada level molekuler (sekuen DNA). Sementara itu, kekerabatan genetik dapat diduga dengan menggunakan metode analisis kluster. Dalam analisis ini, pengelompokan didasarkan pada similaritas atau kemiripan karakter yang dimiliki masing-masing individu yang diamati. Menurut Mcintosh *et al.* (2010), untuk mencerminkan jarak genetik masing-masing individu secara kuantitatif dalam analisis kluster dapat digunakan nilai

*Euclidean*. Di lain pihak, analisis komponen utama atau *Principal Component Analysis* (PCA) dapat dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar-karakter tumbuhan yang diamati, serta menentukan karakter mana yang berpengaruh terhadap keragaman genetik yang muncul (Granato *et al.*, 2018). Secara singkat, melalui analisis PCA memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi penting yang representatif untuk tujuan pemuliaan, seperti data hubungan antar-karakter (Das *et al.*, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya, secara *in silico*. Menurut Karp *et al.* (1997), kajian tentang keragaman dan kekerabatan genetik sangat diperlukan (penting) untuk mendukung upaya konservasi dan pemuliaan suatu plasma nutfah pada masa mendatang. Dalam program pemuliaan, keragaman genetik merupakan modal dasar untuk memperoleh karakter unggul yang diinginkan (Acquaah, 2012). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian, budidaya dan pemanfaatan *Garcinia* di Indonesia.

## BAHAN DAN CARA KERJA

### Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara *in silico*, yaitu dengan mengumpulkan dan mentabulasi berbagai data (pustaka/literatur) tentang ragam spesies *Garcinia* yang terdapat di Indonesia dan kandungan senyawa bioaktif, serta aktivitas biologis yang dimilikinya. Pada penelitian ini, digunakan 64 spesies *Garcinia* sebagai acuan (Uji, 2007) (Tabel 4).

### Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *multivariate* menggunakan pendekatan taksonomi numerik, dengan bantuan *software* MVSP ver. 3.1 (Kovach, 2007). Keragaman genetik *Garcinia* kemudian ditentukan menggunakan indeks keragaman genetik Shannon-Weaver ( $H'$ ), dengan persamaan berikut:

$$H' = - \sum pi(\log_2 pi)/\log_2 N$$

dimana,  $p_i$  adalah perbandingan frekuensi karakter yang diamati, sedangkan  $N$  adalah jumlah seluruh karakter yang diamati. Tingkat keragaman genetik ditentukan dengan kriteria, yaitu maksimum ( $H = 1,00$ ), tinggi ( $H = 0,76–0,99$ ), moderat ( $H = 0,46–0,75$ ), dan rendah ( $H = 0,01–0,45$ ) (Rabara *et al.*, 2014). Analisis komponen utama (PCA) dilakukan pula untuk melihat karakter mana yang menjadi penciri atau memberikan kontribusi terhadap keragaman genetik yang muncul (Das *et al.*, 2017). Sementara itu, rekonstruksi kekerabatan genetik *Garcinia* menggunakan analisis kluster dengan metode UPGMA (*unweighted pair group of arithmetic means*). Analisis dilakukan menggunakan software MVSP ver. 3.1 (Kovach, 2007).

## HASIL

### Keragaman Genetik

Hasil penelusuran literatur, didapatkan 64 spesies *Garcinia* yang memiliki beragam senyawa bioaktif dan aktivitas biologinya (Lampiran 1). Secara umum, senyawa bioaktif yang dimiliki *Garcinia* tergolong senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan beberapa senyawa lainnya (Tabel 1). *Garcinia* memiliki keragaman genetik rendah berdasarkan senyawa bioaktifnya, namun dalam hal ini xanton merupakan senyawa bioaktif yang memiliki keragaman genetik tinggi (0,87). Sementara itu, senyawa-senyawa lainnya memiliki keragaman

genetik rendah, kecuali alkaloid dengan keragaman genetik sedang (0,55) (Tabel 1).

Berdasarkan aktivitas biologis dari senyawa bioaktif yang dihasilkan, *Garcinia* juga menunjukkan keragaman genetik rendah, dengan rerata sebesar 0,30 (Tabel 2). Namun antifungi adalah aktivitas biologis yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (0,78). Sementara itu, dua aktivitas lainnya, yaitu antinyeri dan antiplasmodial memiliki keragaman genetik sedang, masing-masing sebesar 0,72 dan 0,54 (Tabel 2).

Berdasarkan bagian/orgaan tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif, *Garcinia* juga menunjukkan keragaman genetik rendah. Namun daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki keragaman tinggi, dengan nilai 0,79 (Tabel 3). Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa biji memiliki keragaman sedang (0,50), adapun bagian kulit buah yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif memiliki keragaman genetik rendah (0,22).

Hasil analisis PCA (Tabel 4) memperlihatkan bahwa senyawa asam lemak dan steroid berkontribusi paling tinggi terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Sementara itu, kontribusi paling tinggi berdasarkan aktivitas biologis dan organ tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif diperlihatkan oleh aktivitas antinyeri, antioksidan dan antiplasmodial, serta organ batang (Tabel 4).

**Tabel 1.** Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan senyawa bioaktif (*Genetic diversity of Garcinia based on bioactive compounds*)

No.	Senyawa Bioaktif ( <i>Bioactive Compound</i> )	H indeks ( <i>H index</i> )
1.	Alkaloid	0,55**
2.	Antosianin	0,12*
3.	Asam lemak	0,16*
4.	Asam organik	0,22*
5.	Benzofenon	0,11*
6.	Fenol	0,14*
7.	Flavonoid	0,19*
8.	Glikosida	0,22*
9.	Kalkon	0,19*
10.	Saponin	0,27*
11.	Steroid	0,24*
12.	Terpenoid	0,27*
13.	Xanton	0,87***
	Rerata	0,27*

Ket. \*\*\*tinggi; \*\*sedang; \*rendah.  
[Note. \*\*\*high; \*\*moderate; \*low]

**Tabel 2.** Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan aktivitas biologis senyawa bioaktif yang dihasilkan  
(*Genetic diversity of Garcinia based on biological activity of bioactive compounds produced*)

No.	Aktivitas Biologis ( <i>Biological Activity</i> )	H indeks ( <i>H index</i> )
1.	Antibakteri	0,12*
2.	Antifungi	0,78***
3.	Antiimunodulator	0,13*
4.	Antiinflamasi	0,22*
5.	Antikanker	0,12*
6.	Antileukimia	0,22*
7.	Antimalaria	0,22*
8.	Antinyeri	0,72**
9.	Antioksidan	0,15*
10.	Antiplasmodial	0,54**
11.	Antiplatelet	0,19*
12.	Antivirus	0,27*
13.	Hipoglikemik	0,22*
14.	Sitotoksik	0,27*
Rerata		0,30*

Ket. \*\*\*tinggi; \*\*sedang; \*rendah.  
[Note. \*\*\*high; \*\*moderate; \*low].

**Tabel 3.** Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan bagian/organ tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif (*Genetic diversity of Garcinia based on parts/organs of plants producing bioactive compounds*)

No.	Bagian/Organ Tumbuhan ( <i>parts/organs of plants</i> )	H indeks ( <i>H index</i> )
1.	Akar	0,25*
2.	Batang	0,12*
3.	Biji	0,50**
4.	Buah	0,10*
5.	Cabang/Ranting	0,12*
6.	Daun	0,79***
7.	Getah	0,19*
8.	Kulit Akar	0,13*
9.	Kulit Batang	0,19*
10.	Kulit Buah	0,22*
Rerata		0,26*

Ket. \*\*\*tinggi; \*\*sedang; \*rendah.  
[Note. \*\*\*high; \*\*moderate; \*low].

### Kekerabatan Genetik


Hasil analisis kluster (Gambar 1) menunjukkan bahwa 64 spesies *Garcinia* mengelompok kedalam enam kluster utama, pada koefisien similaritas 0,79. Kluster I dan IV, masing-masing terdiri atas satu spesies, yaitu *G. beccari* dan *G. gummi-gutta*. Sementara itu, kluster II dan III, terdiri atas masing-masing dua spesies (*G. cylindrocarpa* dan *G. balica*; *G. nigrolineata* dan *G. bancana*). Kluster kelima

adalah kelompok terbesar dengan jumlah *Garcinia* sebanyak 53 spesies (Tabel 5). Berdasarkan Gambar 1 diketahui pula bahwa kekerabatan terdekat ditunjukkan oleh tujuh pasang spesies *Garcinia*, meliputi *G. nitida* vs. *G. densivenia*, *G. rigida* vs. *G. urophylla*, *G. urophylla* vs. *G. penangiana*, *G. speciosa* vs. *G. maingayi*, *G. minahassensis* vs. *G. semseii*, *G. porrecta* vs. *G. viltersiana*, dan *G. wichmannii* vs. *G. penangiana*, dengan koefisien

**Tabel 4.** Skor PCA karakter senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan bagian/orgaan *Garcinia* yang menghasilkan senyawa bioaktif (*PCA score of bioactive compounds, biological activities, and parts/organs of Garcinia producing bioactive compounds*)

<b>Karakter (Characters)</b>	<b>Komponen Utama Ke- (Principal Components)</b>				
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Senyawa bioaktif</b>					
Alkaloid**	0,050	0,142 <sup>a</sup>	0,097	0,028	0,250 <sup>a</sup>
Antosianin/anthocyanin**	0,041	0,070	0,214 <sup>a</sup>	0,025	0,176 <sup>a</sup>
Asam lemak/fatty acid****	0,067	0,220 <sup>a</sup>	0,244 <sup>a</sup>	0,149 <sup>a</sup>	-0,246 <sup>a</sup>
Asam organik/organic acid***	-0,213 <sup>a</sup>	0,071	0,115 <sup>a</sup>	-0,312 <sup>a</sup>	0,034
Benzofenon/benzophenone*	-0,257 <sup>a</sup>	-0,022	0,010	0,013	0,000
Fenol/phenol***	-0,031	0,071	0,102 <sup>a</sup>	-0,156 <sup>a</sup>	0,390 <sup>a</sup>
Flavonoid***	-0,078	0,017	0,159 <sup>a</sup>	-0,292 <sup>a</sup>	-0,138 <sup>a</sup>
Glikosida/glycoside***	-0,095	0,103 <sup>a</sup>	0,139 <sup>a</sup>	-0,333 <sup>a</sup>	-0,007
Kalkon/chalcone	0,022	-0,068	0,090	-0,084	-0,073
Saponin**	-0,069	0,053	0,120 <sup>a</sup>	-0,030	-0,303 <sup>a</sup>
Steroid****	0,022	0,134 <sup>a</sup>	0,204 <sup>a</sup>	0,111 <sup>a</sup>	-0,193 <sup>a</sup>
Terpenoid	0,012	-0,010	-0,050	-0,020	0,059
Xanton/xanthone ***	0,058	0,144 <sup>a</sup>	0,151 <sup>a</sup>	0,261 <sup>a</sup>	0,008
<b>Aktivitas Biologis</b>					
Antibakteri/antibacterial*	-0,025	0,003	0,035	0,021	-0,267 <sup>a</sup>
Antifungi***	-0,147 <sup>a</sup>	0,176 <sup>a</sup>	0,116 <sup>a</sup>	0,010	-0,001
Antiimmunomodulator/ antiimmunimodulatory***	-0,343 <sup>a</sup>	0,038	0,099	-0,128 <sup>a</sup>	-0,137 <sup>a</sup>
Antiinflamasivi/ antiinflammatory***	-0,361 <sup>a</sup>	-0,059	-0,014	0,193 <sup>a</sup>	0,119 <sup>a</sup>
Antikanker/anticancer*	-0,312 <sup>a</sup>	0,006	0,024	-0,077	0,037
Antileukimia ***	-0,361 <sup>a</sup>	-0,059	-0,014	0,193 <sup>a</sup>	0,119 <sup>a</sup>
Antimalaria/antimalarial***	-0,361 <sup>a</sup>	-0,059	-0,014	0,193 <sup>a</sup>	0,119 <sup>a</sup>
Antinyeri/antianalgesic ***	0,024	0,197 <sup>a</sup>	0,294 <sup>a</sup>	-0,150 <sup>a</sup>	0,152 <sup>a</sup>
Antiosidan/antioxidant****	-0,273 <sup>a</sup>	0,052	0,107 <sup>a</sup>	-0,172 <sup>a</sup>	-0,203 <sup>a</sup>
Antiplasmodial***	0,129 <sup>a</sup>	0,035	0,183 <sup>a</sup>	0,136 <sup>a</sup>	0,266 <sup>a</sup>
Antiplatelet**	0,046	-0,356 <sup>a</sup>	0,262 <sup>a</sup>	-0,085	-0,001
Antivirus	-0,292 <sup>a</sup>	-0,059	-0,021	0,200 <sup>a</sup>	0,049
Hipoglikemik/hypoglycemic**	0,052	-0,396 <sup>a</sup>	0,270 <sup>a</sup>	0,002	0,002
Sitotoksik/cytotoxic*	0,043	-0,402 <sup>a</sup>	0,278 <sup>a</sup>	0,010	0,002
<b>Organ Tumbuhan</b>					
Akar/radix**	-0,094	-0,005	0,289 <sup>a</sup>	0,258 <sup>a</sup>	0,067
Batang/trunk****	0,039	0,231 <sup>a</sup>	0,303 <sup>a</sup>	0,213 <sup>a</sup>	-0,180 <sup>a</sup>
Biji/seed**	0,054	0,187 <sup>a</sup>	0,115 <sup>a</sup>	-0,077	0,046
Buah/fruit **	-0,058	0,031	-0,056	0,193 <sup>a</sup>	0,137 <sup>a</sup>
Cabang/Rantan/branch/ twig***	0,050	0,163 <sup>a</sup>	0,173 <sup>a</sup>	0,155 <sup>a</sup>	-0,040
Daun/leaf***	-0,112 <sup>a</sup>	0,109 <sup>a</sup>	0,090	-0,201 <sup>a</sup>	0,082
Getah/latex***	0,053	0,031	-0,052	-0,016	0,036
Kulit Akar/root file***	0,055	0,099	0,103 <sup>a</sup>	-0,257 <sup>a</sup>	0,188 <sup>a</sup>
Kulit Batang/bark skin**	0,040	0,082	0,110 <sup>a</sup>	0,005	0,398 <sup>a</sup>
Kulit Buah/fruit peel***	0,040	0,129 <sup>a</sup>	0,138 <sup>a</sup>	0,175 <sup>a</sup>	-0,054
Nilai Eigen/Eigenvalue	5,707	3,595	3,151	2,827	2,408
Persentase/percentage	14,899	9,387	8,227	7,380	6,286
Persentase kumulatif/ cumulative percentage	14,899	24,286	32,513	39,893	46,178

Ket. \*berkontribusi positif terhadap keragaman genetik: \*\*\*\* sangat tinggi; \*\*\* tinggi; \*\* sedang; \* rendah.  
[Note. \*contributed positively to genetic diversity: \*\*\*\* very high; \*\*\* high; \*\* moderate; \* low].



**Gambar 1.** Dendrogram kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya.  
(Dendrogram of *Garcinia* relationships based on the content of bioactive compounds and their biological activity)

similaritas masing-masing sebesar 0,99 (99%). Sementara itu, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54 (54%). Pada penelitian ini, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60.

## PEMBAHASAN

Informasi tentang keragaman dan kekerabatan genetik sangat diperlukan untuk mendukung upaya konservasi dan pemuliaan suatu plasma nutfah pada masa mendatang, terutama seleksi tetua dalam perakitan kultivar unggul (Acquaah, 2012; Karp *et al.*, 1997). Pada penelitian ini, *Garcinia* memiliki keragaman genetik rendah, berdasarkan kandungan bioaktif dan aktivitas biologisnya, ditunjukkan oleh rerata nilai indeks Shannon sebesar 0,28 (Tabel 1-3). Namun demikian, beberapa karakter yang

**Tabel 5.** Pengelompokan *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya (*Clustering of Garcinia based on the content of bioactive compounds and their biological activities*)

No	Nama Spesies (Name of Species)	Kluster (Cluster)	No	Nama Spesies (Name of Species)	Kluster (Cluster)
1.	<i>G. beccari</i>	I	33.	<i>G. forbesii</i>	V
2.	<i>G. cylindrocarpa</i>	II	34.	<i>G. vieillardii</i>	V
3.	<i>G. balica</i>	II	35.	<i>G. viltersiana</i>	V
4.	<i>G. nigrolineata</i>	III	36.	<i>G. solomonensis</i>	V
5.	<i>G. bancana</i>	III	37.	<i>G. porrecta</i>	V
6.	<i>G. gummi-gutta</i>	IV	38.	<i>G. nitida</i>	V
7.	<i>G. microphylla</i>	V	39.	<i>G. densivenia</i>	V
8.	<i>G. mangostana</i> *	V	40.	<i>G. prainiana</i>	V
9.	<i>G. fusiformis</i>	V	41.	<i>G. speciosa</i>	V
10.	<i>G. excavata</i>	V	42.	<i>G. maingayi</i>	V
11.	<i>G. parvifolia</i>	V	43.	<i>G. cornea</i>	V
12.	<i>G. hombroniana</i>	V	44.	<i>G. prussii</i>	V
13.	<i>G. hanburyi</i>	V	45.	<i>G. wickmannii</i>	V
14.	<i>G. gaudichaudii</i>	V	46.	<i>G. urophylla</i>	V
15.	<i>G. griffithii</i>	V	47.	<i>G. rigida</i>	V
16.	<i>G. celebica</i>	V	48.	<i>G. penangiana</i>	V
17.	<i>G. morella</i>	V	49.	<i>G. paucinervis</i>	V
18.	<i>G. mannii</i>	V	50.	<i>G. microcarpa</i>	V
19.	<i>G. tetranda</i>	V	51.	<i>G. merguensis</i>	V
20.	<i>G. minutiflora</i>	V	52.	<i>G. semsei</i>	V
21.	<i>G. SMEATHMANNII</i>	V	53.	<i>G. minahassensis</i>	V
22.	<i>G. dulcis</i>	V	54.	<i>G. picrorhiza</i>	V
23.	<i>G. wightii</i>	V	55.	<i>G. miquelii</i>	V
24.	<i>G. nervosa</i>	V	56.	<i>G. macrophylla</i>	V
25.	<i>G. daedalanthera</i>	V	57.	<i>G. dives</i>	V
26.	<i>G. spicata</i>	V	58.	<i>G. tetralata</i>	V
27.	<i>G. candidulata</i>	V	59.	<i>G. livingstonei</i>	V
28.	<i>G. scorchedianii</i>	V	60.	<i>G. brevirostris</i>	V
29.	<i>G. malaccensis</i>	V	61.	<i>G. subelliptica</i>	VI
30.	<i>G. goudotiana</i>	V	62.	<i>G. schomburgkiana</i>	VI
31.	<i>G. xipshuanbannaensis</i>	V	63.	<i>G. xanthochymus</i>	VI
32.	<i>G. riedeliania</i>	V	64.	<i>G. atroviridis</i>	VI

Ket.\* spesies paling populer dalam genus *Garcinia* [Note. \* the most popular in genus *Garcinia*]

diamati memiliki keragaman genetik tinggi, seperti keberadaan senyawa xanton (Tabel 1), aktivitas antifungi (Tabel 2) dan organ daun (Tabel 3).

Menurut Murthy *et al.* (2019), xanton merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan polifenol dan secara struktur terdiri atas cincin aromatik trisiklik. Senyawa ini diklasifikasikan menjadi lima kelompok utama, yaitu xanton beroksigen sederhana, glikosida xanton, xanton terprenilasi, xantonolignoid, dan xanton dengan struktur lain (Ruan *et al.*, 2017). Senyawa xanton dan turunannya ditemukan pada sebagian besar *Garcinia*, termasuk tiga spesies paling populer, yaitu manggis (*G. mangostana*), *brindle berry* (*G. gummi-gutta*), dan ‘kokum’ (*G. indica*) (Ruan *et al.*, 2017). Pada buah manggis, xanton ditemukan dalam bentuk gugus isoprena, fenolik, dan metoksi yang tersubstitusi. Sampai saat ini, lebih dari 54 turunan xanton telah dilaporkan terdapat pada buah manggis (Murthy *et al.*, 2018). Pada *brindle berry*, juga terdapat xanton dengan struktur polisoprenilasi, yaitu oxy-guttiferone I, oxy-guttiferone K, oxy-guttiferone K2, dan oxy-guttiferone M (Murthy *et al.*, 2018).

Senyawa  $\alpha$ ,  $\beta$  dan  $\gamma$ -mangostin pada manggis adalah senyawa turunan xanton yang dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti antioksidan, antiinflamasi, antikanker, dan antimikroba (Murthy *et al.*, 2018), termasuk antifungi (Rahmayanti *et al.*, 2016; Sholihah *et al.*, 2015). Khusus untuk aktivitas antifungi, ekstrak *G. mangostana* mampu menghambat *Candida albicans* (Rahmayanti *et al.*, 2016) dan *Trichophyton mentagrophytes* (penyebab dermatomycosis) (Sholihah *et al.*, 2015). Aktivitas antifungi juga dilaporkan pada ekstrak *G. artoviridis* dan mampu menghambat fungi *Cladosporium herbarum* (Mackeen *et al.*, 2002).

Xanton dan beragam senyawa metabolit sekunder lainnya pada penelitian ini ditemukan pada organ daun beberapa spesies *Garcinia*, termasuk *G. mangostana* dan *G. gummi-gutta* (Lampiran). Senyawa metabolit sekunder secara umum disekresikan dan disimpan dalam vakuola atau lateks pada daun. Berapa turunan daun seperti trikoma, epidermis, dinding sel juga terkadang menjadi lokasi penimbunan senyawa

metabolit sekunder. Secara biokimiawi, beberapa senyawa metabolit sekunder memiliki jalur biosintesis yang kompleks. Sebagai contoh, senyawa xanton secara biogenik diduga berasal turunan senyawa antara benzofenon melalui jalur campuran sikimat dan asetat (Anantachoke *et al.*, 2012). Mazimba *et al.* (2013), menyebutkan bahwa senyawa antara benzofenon yang dimaksud adalah 2,3'-dihidroksibenzofenon bercincin. Karbon 1-4 yang terdapat pada senyawa tersebut berperan menyusun cincin A yang diturunkan dari asetat, sedangkan karbon 5-8 terhadap cincin turunan sikimat B (Mazimba *et al.*, 2013).

Dalam biosintesis xanton, sintesis senyawa 2,3',4,6-tetrahidroksibenzofenon (THPA) juga sangat berperan. Pada proses ini, benzofenon mengalami siklisasi intramolekul region-selektif melalui tahap oksidasi satu elektron untuk membentuk xanton yang paling sederhana. Jalur biosintesis xanton pada tumbuhan tingkat tinggi diduga melibatkan kondensasi turunan asam sikimat dan malonil-KoA sebagai unit-unit pemanjangannya. Enzim yang diduga terlibat dalam proses tersebut adalah benzofenon sintase, yang termasuk kedalam famili sintase poliketida tipe III (PKS). Enzim ini menghasilkan beragam senyawa metabolit sekunder dengan memanfaatkan variasi substrat sebagai pemicunya (*starter*), jumlah reaksi kondensasi dan reaksi siklisasi untuk menghasilkan *scaffold*, seperti kalkon, piron, kromon, dan stilben (Mazimba *et al.*, 2013).

Pada tumbuhan tingkat tinggi, biosintesis xanton meliputi dua tahap utama. Tahap pertama adalah siklisasi senyawa 2,3',4,6-tetrahidroksibenzofenon (THPA) secara regio-selektif atau melalui kontrol orientasional, maksudnya pembentukan satu isomer konstitusional sebagai produk utama di mana dua atau lebih isomer konstitusional dapat diperoleh. Sebagai contoh pada *G. mangostana*, siklisasi yang terjadi pada posisi *para* menghasilkan 1,3,7-trihidroksixanton. Tahap kedua (terakhir) adalah hidrosilasi, sehingga terbentuk senyawa 1,3,6,7-tetrahidroksixanton. Pada tahap ini, xanton sintase sangat diperlukan dan merupakan sitokrom P<sub>450</sub> oksidase yang memerlukan NADPH dan O<sub>2</sub>. Mekanisme reaksi siklisasi mengikuti reaksi

penggandengan fenol oksidatif yang sangat disukai oleh adanya gugus 3'-hidroksil pada posisi *ortho*-*para* (Mazimba *et al.*, 2013).

Berdasarkan analisis kluster (UPGMA), diketahui bahwa *Garcinia* memiliki kekerabatan genetik yang kompleks. Hal ini ditunjukkan oleh kekerabatan genetik terdekat oleh tujuh pasang spesies *Garcinia*, meliputi *G. nitida* vs. *G. densivenia*, *G. rigida* vs. *G. urophylla*, *G. urophylla* vs. *G. penangiana*, *G. speciosa* vs. *G. maingayi*, *G. minahassensis* vs. *G. semseii*, *G. porrecta* vs. *G. viltersiana*, dan *G. wightmannii* vs. *G. penangiana*, dengan koefisien similaritas masing-masing sebesar 0,99. Kompleksitas kekerabatan *Garcinia* diperlihatkan pula oleh kekerabatan terjauh *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54 (54%).

Dalam pemuliaan tanaman, kekerabatan genetik terjauh antar tetua sangat dipertimbangkan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki keragaman genetik tinggi atau luas. Sebaliknya, persilangan tetua yang memiliki kekerabatan genetik dekat cenderung dihindari, karena dapat menghasilkan keturunan dengan keragaman genetik rendah atau sempit, dalam genetika dikenal dengan istilah *inbreeding* (Acquaah, 2012).

*Garcinia mangostana* pada penelitian ini merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Uji (2007) melaporkan bahwa *G. cylindrocarpa* adalah spesies endemik kepulauan Maluku. Menurut Nazre (2014), berdasarkan karakteristik bunga jantan (terutama warna kelopak, keberadaan dan bentuk pistil), bentuk buah, warna daun, serta pola garis pada glandular, *G. mangostana* paling mirip dengan *G. malaccensis*. Hasil ini dipertegas oleh penelitian Sobir *et al.* (2009) dengan menggunakan penanda isozim dan AFLP.

Berdasarkan penanda isozim, Sinaga *et al.* (2010) melaporkan kedekatan hubungan kekerabatan antara *G. mangostana*, *G. malaccensis*, dan *G. hombroniana*. Bahkan spesies terakhir (*G. hombroniana*) diduga sebagai nenek moyang (progenitor) *G. mangostana* (Sobir *et al.*, 2009).

Menggunakan penanda ISSR, Sobir *et al.* (2011) melaporkan dugaan *G. malaccensis* sebagai turunan allopoliploid dari *G. mangostana*. Hasil penelitian Sulassih *et al.* (2013) juga mengungkapkan pengelompokan ketiga spesies ini berdasarkan penanda morfologis dan ISSR, serta menduga bahwa *G. malaccensis* dan *G. celebia* adalah nenek moyang *G. mangostana*. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abdullah *et al.* (2012) dengan menggunakan penanda ITS, *trnL* dan *accD-psal*.

Hasil rekonstruksi kekerabatan genetik menggunakan penanda molekuler ITS (*internal transcribed spacer*), *G. mangostana* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. penangiana* (Nazre, 2014; Nazre *et al.*, 2007). Menggunakan penanda yang sama (ITS), Parthasarathy *et al.* (2016) melaporkan kedekatan antara *G. mangostana* *G. xanthochymus*. Hal ini berkorelasi pula secara morfologis karena keduanya memiliki bentuk kanopi dan daun yang sama (Parthasarathy *et al.*, 2016). Adapun Liu *et al.* (2016), melaporkan kedekatan *G. mangostana* dengan *G. intermedia*, juga dengan penanda ITS.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kandungan senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan organ yang menghasilkan senyawa bioaktif, *Garcinia* memiliki rentang keragaman genetik rendah (sempit), dengan rerata indeks Shannon sekitar 0,28. Namun senyawa xanton, aktivitas antifungi dan organ daun adalah tiga karakter *Garcinia* yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (luas). Hasil analisis PCA, memperlihatkan bahwa ketiga karakter tersebut berkontribusi positif terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Hasil analisis kluster membagi 64 spesies *Garcinia* kedalam enam kluster utama, yang didalamnya kluster kelima adalah kelompok terbesar dengan jumlah anggota sebanyak 53 spesies. Pada penelitian ini, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54. Sementara itu, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan

kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Informasi ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian dan pemuliaan *Garcinia* di Indonesia, terutama seleksi tetua untuk perakitan kultivar unggul.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Kelompok Studi "Genetika dan Biologi Molekuler", Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat atas waktu luangnya untuk berdiskusi mengenai topik penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N.A.P., Richards, A.J. and Wolff, K., 2012. Molecular evidence in identifying parents of *Garcinia mangostana* L. *Pertanika Journal Tropical Agriculture Science*, 35, pp. 257–270.
- Acuna, U.M., Dastmalchi, K., Basile, M.J. and Kennelly, E. J., 2012. Quantitative highperformance liquid chromatography photo-diode array (HPLC-PDA) analysis of benzophenones and biflavonoids in eight *Garcinia* species. *Journal of Food Composition and Analysis*, 25(2), pp. 215–220.
- Acquaah, G., 2012. *Principles of Plant Genetics and Breeding*: Second Edition, John Wiley and Sons.
- Alen, Y., Safitri, N., Ali, A.M., Ladjis, N.H. and Sargent, M.V., 2008. Rubraxhantone dari *Garcinia forbesii* King. dan Bioaktivitasnya. *Jurnal Riset Kimia*, 1, pp. 192–201.
- Ambarwati, N.S.S., 2018. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Penghambat Pertumbuhan Mikroba dari Tanaman *Garcinia latissima* Miq. *Jurnal Farmasi*, 1(1), pp. 1–8.
- Anantachoke, N., Tuchinda, P., Kuhakarn, C., Pohmakotr, M. and Reutrakul, V., 2012. Prenylated caged xanthones: Chemistry and biology. *Pharmaceutical Biology*, 50, pp. 78–91.
- Aravind, A.P., Asha, K.R.T. and Rameshkumar, K.B., 2016. Phytochemical analysis and antioxidant potential of the leaf of *Garcinia travancorica* Bedd. *Natural Product Research*, 30(2), pp. 232–236.
- Arumugam, A.M.A.L., 2017. Secondary Metabolites from Stem Bark of *Garcinia beccarii* Pierre and *Garcinia cuneifolia* Pierre. *Thesis*. Universiti Putra Malaysia. pp. 1–29.
- Arwa, P.S., Zeraik, M.L., Ximenes, V.F., da Fonseca, L.M., da Bolzani, S.V. and Silva, D.H.S., 2015. Redox-active biflavonoids from *Garcinia brasiliensis* as inhibitors of neutrophil oxidative burst and human erythrocyte membrane damage. *Journal of Ethnopharmacology*, 174 (1), pp. 410–418.
- Chang, S.C., Chyu, C.F., Chang, I.S., Chiu, H.L. and Kuo, Y.H., 2016. A novel polyprenylated phloroglucinol, garcinialone, from the roots of *Garcinia multiflora*. *Tetrahedron Letter*, 49(36), pp. 5276–5278.
- Chen, J.J., Ting, C.W., Hwang, T.L. and Chen, I.S., 2010. Benzophenone derivatives from the fruits of *Garcinia multiflora* and their anti-inflammatory activity. *Journal of Natural Product*, 72(2), pp. 253–258.
- Dachriyanus, M., Izati, and R., Fahmi, 2004. Senyawa Antioksidan dari Tumbuhan *Garcinia parvifolia*. *Miq. Jurnal Kimia Andalas*, 10(1), pp. 11–14.
- Dahlan, Z., Hanum, L. and Zahar, E., 2009. Eksplorasi keragaman *Garcinia* L. berdasarkan sumber bukti makromorfologi dan pemanfaatannya bagi perkuliahan morfologi tumbuhan. *Jurnal Pendidikan*, 28(2), pp. 164–172.
- Das, S., Das, S.S., Chakraborty, I., Roy, N. and Sarma, D., 2017. Principal Component Analysis in Plant Breeding. *Biomolecules Reports*, 9, pp. 15–18.
- Deng, X.Y., Pan, S.L., Zhao, S.Y., Wu, M.Q., Sun, Z.Q., Chen, X.H., and Shao, Z.Y., 2012. Cytotoxic alkoxylated xanthones from the resin of *Garcinia hanburyi*. *Fitoterapia*, 83(8), pp. 1548–1552.
- Ee, G.C.L., Foo, C.H., Jong, V.Y.M., Ismail, N.H., Sukari, M.A., Yap, Y.T. and Awang, K., 2012. A new xanthone from *Garcinia nitida*. *Natural Product Research*, 26(9), pp. 830–835.
- Elfita, E., Muhamni, M., Latief, M., Darwati, D., Widiyantoro, A., Supriyatna, S., Bahti, H.H., Dachriyanus, D., Cos, P., Maes, L., Foubert, K., Apers, S. and Pieters, L., 2009. Phytochemistry Antiplasmoidal and other constituents from four Indonesian *Garcinia* spp. *Phytochemistry*, 70, pp. 907–912.
- Elsavioristi, H., 2015. Isolasi Lupeol dari Ekstrak Metanol Ranting *Garcinia balica* Miq. *Skripsi*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Erawati, 2012. Uji Aktivitas Antioksidan dan Ekstrak Daun *Garcinia daedalanthera* Pierre dengan Metode DPPH (1,1-Difenil Pilkrilhidrazil) dan Identifikasi Golongan Senyawa Kimia dari Fraksi Paling Aktif. *Skripsi*. UI, Jakarta.
- Eviati, P. dan Ersam, T., 2014. Isolasi 1-Hidroksi-5,6,8-Trimetoksi-(3',3':2,3)-Dimetilpiranosanton dari Ekstrak Metanol Kulit Batang *Garcinia cylindrocarpa*. *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, 1, pp. 1–6.
- Fouotsa, H., Lannang, A.M., Dzoyem, J.P., Tatsumi, S.J.N., Neumann, B., Eloff, J.N. and Sewald, N., 2015. Antibacterial and Antioxidant Xanthones and Benzophenone from *Garcinia smethmannii*. *Planta Medica*, 81, pp. 594–599.
- Frankham, R., Ballou, J.D. and Briscoe, D.A., 2004. *A Primer of Conservation Genetics*. Cambridge University Press, New York.
- Granato, D., Santos, J.S., Escher, G.B., Ferreira, B.L. and Maggio, R.M., 2018. Use of principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis (HCA) for multivariate association between bioactive compounds and functional properties in foods: A critical perspective. *Trends of Food Science and Technology*. Accepted manuscript, pp. 1–41.
- Guo, Y.E., Wang L.L., Li, Z.L., Niu, S.L., Liu, X.Q., Hua, H.M., Chen, H., Chu, J. and Zhang, T.C., 2011. Triterpenes and xanthones from the stem bark of *Garcinia tetraloba*. *Journal of Asian Natural Product Research*, 13(05), pp. 440–443.
- Hamidon, H., Susanti, D., Taher, M., Zakaria, Z.A., 2017. *Garcinia atroviridis* – A review on phytochemicals and pharmacological properties. *Marmara Pharmaceutical Journal*, 21, pp. 38–47.
- Hartati, S., Triyono, I.K. and Handayani, S., 2014. Cytotoxic Isobractatin (Prenylated Xanthone) Epimer Mixture of *Garcinia eugenifolia*. *Indonesian Journal of Chemistry*, 14, pp. 277–282.
- Hay, A.E., Merza, J., Landreau, A., Litaudon, M., Pagniez, F., Le Pape, P. and Richomme, P., 2008. Antileishmanial polyphenols from *Garcinia vieillardii*. *Fitoterapia*, 79(1), pp. 42–46.
- Hemshekher, M., Sunitha, K., Santhosh, K.S., Devaraja, S., Kempraju, K., Vishwanath, B.S., Niranjana, S.R. and Girish, K.S., 2011. An overview on genus *Garcinia*: phytochemical and therapeutical aspects. *Journal Phytochemistry*, 10(1), pp. 325–351.

- Hu, Q., Niu, D., Wang, S., Qin, Y., Yang, Z., Zhao, G., Yang, Z., Gao, X. and Chen, Z., 2014. New flavones from *Garcinia bracteata* and their biological activities. *Chemistry of Natural Compounds*, 50(6), pp. 985–988.
- Ihsany, A.U. dan Ersam, T., 2018.  $\alpha$ -Mangostin dari Ekstrak Kayu dan Kulit Akar *Garcinia tetrandra* Pierre. *Akta Kimia Indonesia*, 3(1), pp. 96–103.
- Ismanto, A.W., 2014. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Santon Tersiklasi dari Kulit Akar *Garcinia dulcis*. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Jamila, N., Khairuddean, M., Khan, S.N., Khan, N. and Osman, H., 2014. Phytochemicals from the bark of *Garcinia hombroniana* and their biological activities. *Research of Natural Products*, 8(3), pp. 312–316.
- Jayanti, H.S.D. dan Ersam, T., 2018. Digeranilasi Santon pada Ekstrak Diklorometana Kulit Batang Wadung (*Garcinia tetranda* Pierre). *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 7(1), pp. 1–4.
- Karo-Karo, T., Julianti, E. and Nurminah, M., 2019. Physicochemical Properties of Gelugur Powder (*Garcinia atroviridis*), in: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing Ltd., pp. 1–4.
- Karp, A., Kresovich, S., Bhat, K. V., Ayad, W.G. and Hodgkin, T., 1997. Molecular tools in plant genetic resources conservation: A guide in the technologies, IPGRI technical bulletin.
- Khalid, R.M., Jabit, M.L., Abas, F., Stanslas, J., Shaari, K. and Lajis, N.H., 2007. Cytotoxic xanthones from the leaf of *Garcinia urophylla*. *Natural Products Communication*, 2 (3), pp. 271–276.
- Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S., 2013. Friedolanostanes and xanthones from the twigs of *Garcinia hombroniana*. *Phytochemistry*, 85(1), pp. 161–166.
- Kovach, W.L., 2007. Multi-variate statistical package for windows, ver. 3.1. Kovach Computing Services, Wales UK.
- Lailati, M., 2017. Koleksi *Garcinia* spp. dan Potensinya di Kebun Raya Cibodas. Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Tanaman Lokal untuk Pangan dan Industri, 1(1), pp. 34–38.
- Lavaud, A., Richomme, P., Gatto, J., Aumond, M.C., Poullain, C., Litaudon, M., Andriantsithaina, R. and Guillet, D., 2015. A tocotrienol series with an oxidative terminal prenyl unit from *Garcinia amplexicaulis*. *Phytochemistry*, 109(1), pp. 103–110.
- Le, D.H., Nishimura, K., Takenaka, Y., Mizushima, Y. and Tanahashi, T., 2016. Polyprenylated benzoylphloroglucinols with DNA polymerase inhibitory activity from the fruits of *Garcinia schomburgkiana*. *Journal of Natural Products*, 79(7), pp. 1798–1807.
- Liu, Z., Ni, Y. and Liu, B.O., 2016. Genetic relationships of several *Garcinia* species (Clusiaceae) revealed by ITS sequence data. *International Education Science Research Journal*, 2, pp. 11–15.
- Mackeen, M.M., Ali, A.M., Lajis, N.H., Kawazu, K., Kikuzaki, H. and Nakatani, N., 2002. Antifungal garcinia acid esters from the fruits of *Garcinia atroviridis*. *Zeitschrift fur Naturforsch. - Sect. C Journal Bioscience*, 57, pp. 291–295.
- Mahamodo, S., Rivière, C., Neut, C., Abedini, A., Ranarivelo, H., Duhal, N., Roumy, V., Hennebelle, T., Sahpaz, S., Lemoine, A., Razafimahefo, B., Bailleul, F., Razafimahefo, D. and Andriamihaja, B., 2014. Antimicrobial prenylated benzoylphloroglucinol derivatives and xanthones from the leaf of *Garcinia goudotiana*. *Phytochemistry*, 102(1), pp. 162–168.
- Mahmiah, dan Ersam, T., 2011. Santon Termodifikasi dari *Garcinia cylindrocarpa* Kosterm. Bersifat Aktif Anti-malaria. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Mazimba, O., Nana, F., Kuete, V. and Singh, G.S., 2013. Xanthones and Anthranoids from the Medicinal Plants of Africa, in: Medicinal Plant Research in Africa. Elsevier Inc., pp. 393–434.
- Mcintosh, A.M., Sharpe, M. and Lawrie, S.M., 2010. Research methods, statistics and evidence-based practice, in: Companion to Psychiatric Studies. Elsevier Ltd., pp. 157–198.
- Meechai, I., Phupong, W., Chunglok, W. and Meepowpan, P., 2016. Anti-radical activities of xanthones and flavonoids from *Garcinia schomburgkiana*. *International Journal of Pharmaceutical Science*, 8(9), pp. 235–238.
- Meesakul, P., Pansanit, A., Maneerat, W., Sripisut, T., Ritthiwigrom, T., Machana, T., Cheenpracha, S., and Laphookhieo, S., 2016. Xanthones from *Garcinia propinqua* Roots. *Natural Product Communications*, 11 (1), pp. 87–90.
- Messi, B.B., Ndjoko-Isot, K., Hertlein-Amslinger, B., Lannang, A.M., Nkengfack, A.E., Wolfender, J.L., Hostettmann, K. and Bringmann, G., 2012. Preussianone, a new flavanonechromone biflavonoid from *Garcinia preussii* Engl. *Molecules*, 17(5), pp. 6114–6125.
- Mian, V.J., 2012. Phytochemical Studies of *Garcinia eugenifolia* Wall., *G. nitida* Pierre., *G. mangosyana* L., and *Morinda citrifolia* L. and their Biological Activities. Thesis. Universiti Putra Malaysia.
- Momo, I.J., Kuete, V., Dufat, H., Michel, S. and Wandji, J., 2011. Antimicrobial activity of the methanolic extract and compounds from the stem bark of *Garcinia lucida* Vesque (Clusiaceae). *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science*, 3(11), pp. 215–217.
- Muharni, 2010. Triterpenoid Lupeol dari Manggis Hutan (*Garcinia bancana* Miq.). *Jurnal Penelitian Sains*, 13, pp. 40–45.
- Muharni, Elfita, and Handi, 2011. 3-Oxo Friedelin Compound from the Stem Bark of Manggu Leuweung (*Garcinia cornea*), in: Proceedings of the International Seminar on Exploring Research Potentials. Sriwijaya University, Palembang, pp. 265–271.
- Muharni, Supriyatna, Bahti, H.H. and Dachriyanus, 2009. Phenolic Compound from the Stem Bark of Manggis Hutan (*Garcinia bancana* Miq.) and their Antioxidant Activity. *Indonesian Journal of Chemistry*, 9, pp. 321–327.
- Murthy, H.N., Dandin, V.S., Dalawai, D., Park, S.-Y., Paek, K.-Y., 2019. Bioactive Compounds from *Garcinia* Fruits of High Economic Value for Food and Health, in: Merillon, J.M., Ramawat, K.G. (Eds.), Bioactive Molecules in Food. Springer Nature Switzerland AG, pp. 1643–1670.
- Murthy, H.N., Dandin, V.S., Dalawai, D., Park, S.-Y. and Paek, K.-Y., 2018. Breeding of *Garcinia* spp., in: Al-Khayri, J.M. (Ed.), Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits. Springer International Publishing AG, pp. 773–809.
- Muthia, R., Saputri, R. dan Verawati, S.A., 2019. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Buah Mundar (*Garcinia forbesii* King.) Menggunakan Metode DPPH (2, 2-Diphenyl-1- Picrylhydrazyl). *Jurnal Pharmascience*, 06, pp. 74–82.
- Nazre, M., 2014. New evidence on the origin of mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) based on morphology and ITS sequence. *Genetics Resources of Crop Evolution*, 61, pp. 1147–1158.
- Nazre, M., Clyde, M.M. and Latiff, A., 2007. Phylogenetic relationships of locally cultivated *Garcinia* species with some wild relatives. *Malaysian Applied Biology*, 36, pp. 31–40.
- Nidyasari, R.S., Akmal, H. and Ariyanti, N.S., 2018. Karakterisasi morfologi dan anatomi tanaman manggis dan kerabatnya (*Garcinia* spp.) di Taman Buah Mekarsari. *Jurnal Sumberdaya Hayati*, 4(1), pp. 12–20.

- Nontakham, J., Charoenram, N., Upamai, W., Taweechotipatr, M. and Suksamrarn, S., 2014. Anti-Helicobacter pylori xanthones of *Garcinia fusca*. *Archives of Pharmacological Research*, 37(8), pp. 972–977.
- On, S., Aminudin, N., Ahmad, F., Sirat, H.M. and Taher, M., 2016. Chemical constituents from stem bark of *Garcinia prainiana* and their bioactivities. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry Research*, 8(5), pp. 756–760.
- Osorio, E., Londono, J. and Bastida, J., 2013. Low-Density lipoprotein (LDL)-Antioxidant biflavonoids from *Garcinia madruno*. *Molecules*, 18(5), pp. 6092–6100.
- Pandey, R., Chandra, P., Kumar, B., Srivastva, M., Aravind, A.A., Shameer, P.S. and Rameshkumar, K.B., 2015. Simultaneous determination of multi-class bioactive constituents for quality assessment of *Garcinia species* using UHPLC-QqQ LITMS/MS. *Indian Crops Product*, 77(1), pp. 861–872.
- Parthasarathy, U., Nandakishore, O.P., Rosana, O.B., Nirmal Babu, K., Senthil Kumar, R. and Parthasarathy, V.A., 2016. Identification of molecular markers to study the *Garcinia* spp. diversity. *Indian Journal Experimental Biology*, 54, pp. 400–405.
- Pratiwi, P. dan Ersam, T., 2013. Uji Kemurnian Dua Senyawa dari Ekstrak Metanol Kayu Batang *Garcinia cylindrocarpa*. *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, 2(2), pp. 2337–3520.
- Purbowati, R. dan Ersam, T., 2017. 2, 4, 6-Trihidroksi Benzofenon dari Kulit Batang *Garcinia balica* Miq. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6, pp. 2337–3520.
- Rabara, R.C., Ferrer, M.C., Diaz, C.L., Newingham, M.C.V. and Romero, G.O., 2014. Phenotypic diversity of farmers' traditional rice varieties in the Philippines. *Agronomy*, 4, pp. 217–241.
- Rahmayanti, F., Suniarti, D.F., Masud, Z.A., Bachtiar, B.M., Wimardhani, Y.S. and Subita, G.P., 2016. Ethyl acetate fraction of *Garcinia mangostana* Linn pericarp extract: Anti-*Candida albicans* and epithelial cytotoxicity. *Asian Journal of Pharmacy and Clinical Research*, 9, pp. 335–338.
- Ruan, J., Zheng, C., Liu, Y., Qu, L., Yu, H., Han, L., Zhang, Y. and Wang, T., 2017. Chemical and Biological Research on Herbal Medicines Rich in Xanthones. *Molecules*, 22, pp. 1–19.
- See, I., Ee, G.C.L., Teh, S.S., Kadir, A.A. and Daud, S., 2014. Two new chemical constituents from the stem bark of *Garcinia mangostana*. *Molecules*, 19(6), pp. 7308–7316.
- Sharif, N.W.M., Mustahil, N.A., Noor, H.S.M., Sukari, M.A., Rahmani M., Taufiqyap, Y.H. and Ee, G.C.L., 2011. Cytotoxic Constituents of *Calausea excavata*. *African Journal of Biotechnology*, 10(72), pp. 337–341.
- Sholihah, T.P., Martina, A. dan Yuharmen, 2015. Uji Aktivitas Antifungal Kulit Manggis (*Garcinia mangostana*) dan Semangka (*Citrullus vulgaris*) terhadap *Trichophyton mentagrophytes* Penyebab Dermatomycosis. *JOM FMIPA*, 2, pp. 1–10.
- Sinaga, S., Sobir, Poerwanto, R., Aswidinnoor, H. and Duryadi, D., 2010. Genetic Diversity and The Relationship Between The Indonesian Mangosteen (*Garcinia mangostana*) and The Related Species Using Isozyme Markers. *Jurnal Natur Indonesia*, 13, pp. 53–58.
- Siridechakorn, I., Phakhodee, W., Ritthiwigrom, T., Promgool, T., Deachathai, S., Cheenpracha, S., Prawat, U. and Laphookhieo, S., 2012. Antibacterial dihydrobenzopyran and xanthone derivatives from *Garcinia cowa* stem barks. *Fitoterapia*, 83(8), pp. 1430–1434.
- Sobir, Poerwanto, R., Santosa, E., Sinaga, S. and Mansyah, E., 2011. Genetic variability in apomictic mangosteen (*Garcinia mangostana*) and its close relatives (*Garcinia* spp.) based on ISSR markers. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 12, pp. 59–63.
- Sobir, Sinaga, S., Poerwanto, R., Rismitasari, and Lukman, R., 2009. Comparison Analysis of Genetic Diversity of Indonesian Mangosteens (*Garcinia mangostana* L.) and Related Species by using on Isozymes and AFLP Markers. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 10, pp. 163–167.
- Stark, T.D., Losch, S., Salger, M., Balemba, O.B., Wakamatsu, J., Frank, O. and Hofmann, T., 2015. A new NMR approach for structure determination of thermally unstable biflavonones and application to phytochemicals from *Garcinia buchananii*. *Magazine of Resonance Chemistry*, 53(10), pp. 813–820.
- Sukandar, E.R., Kaennakam, S., Rassamee, K., Siripong, P., Fatmawati, S., Ersam, T. and Tip-pyang, S., 2018. Xanthones and biphenyls from the stems of *Garcinia cylindrocarpa* and their cytotoxicity. *Fitoterapia*, 130, pp. 112–117.
- Sulassih, Sobir, and Santosa, E., 2013. Phylogenetic analysis of mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) and its relatives based on morphological and inter simple sequence repeat (ISSR) markers. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*, 45, pp. 478–490.
- Taher, M., Susanti, D., Rezali, M.F., Zohri, F.S.A., Ichwan, S.J.A., Alkhamaiseh, S.I. and Ahmad, F., 2012. Apoptosis, antimicrobial and antioxidant activities of phytochemicals from *Garcinia malaccensis* Hk. f. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 5(2), pp. 136–141.
- Tan, W.N., Khairudean, M., Wong, K.C., Tong, W.Y. and Ibrahim, D., 2016. Antioxidant compounds from the stem bark of *Garcinia atroviridis*. *Journal of Asian Natural Product Research*, 18(8), pp. 804–811.
- Tantapakul, C., Phakhodee, W., Ritthiwigrom, T., Cheenpracha, S., Prawat, U., Deachathai, S. and Laphookhieo, S., 2012. Rearranged benzophenones and prenylated xanthones from *Garcinia propinqua* twigs. *Journal of Natural Products*, 75(9), pp. 1660–1664.
- Trisulan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and Hutadilok-Towatana, N., 2013. Tetraoxxygenated xanthones and biflavonoids from the twigs of *Garcinia merguensis*. *Phytochemistry Letters*, 6(4), pp. 511–513.
- Uji, T., 2007. Keanekaragaman, Persebaran dan Potensi Jenis *Garcinia* di Indonesia. *Berkala Penelitian Hayati*, 12, pp. 129–135.
- Utami, S., 2016. Patentabilitas Antibakteri dari Tanaman *Garcinia*. *Jurnal Teknik Kedokteran Yarsi*, 24(1), pp. 69–79.
- Vo, H.T., Ngo, N.T., Bui, T.Q., Pham, H.D. and Nguyen, L.H.D., 2015. Geranylated tetraoxxygenated xanthones from the pericarp of *Garcinia pedunculata*. *Phytochemistry Letters*, 13(1), pp. 119–122.
- Widiastuti, A., Obir, and Suhartanto, M.R., 2010. Diversity analysis of mangosteen (*Garcinia mangostana*) irradiated by gamma-ray based on morphological and anatomical characteristics. *Nusantara Bioscience*, 2, pp. 23–33.
- Widyowati, R. dan Rahman, A., 2010. Kandungan Kimia dan Aktivitas Antimikroba Ekstrak *Garcinia celebica* L. terhadap *Staphylococcus aureus*, *Shigella dysenteriae* dan *Candida albicans*. *Jurnal Farmasi Airlangga*, 8(2), pp. 23–27.
- Yang, Y., Li, L. and Lou, J., 2015. Isoprenylated flavones from *Garcinia bracteata* and their anti-tobacco mosaic virus activity. *Heterocycles*, 91(2), pp. 375–380.
- Zhao, Y., Liu, J.P., Lu, D., Li, P.Y. and Zhang, L.X., 2012. Two new xanthones from the pericarp of *Garcinia mangostana*. *Natural Products Research*, 26(1), pp. 61–65.

**Lampiran 1.** Ragam Senyawa Bioaktif dan Aktivitas Biologis yang dihasilkan *Garcinia* (*Diversity of Bioactive Compounds and Biological Activities produced by Garcinia*)

**Tabel 6.** Ragam senyawa bioaktif dan aktivitas biologis yang dihasilkan *Garcinia* (*Diversity of bioactive compounds and biological activities produced by Garcinia*)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Nama Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
1	<i>G. atroviridis</i>	23	9	Flavonoid & Asam Organik	Biflafon, Asam sitrat, Asam tartarik, Asam malik, Asam askorbik, Asam pentadekonik, Asam nonaeikonik, Asam dodekanolk, & Asam hidroksitrat.	Buah dan Kulit buah	Antibakteri	Hamidon <i>et al.</i> (2017); Karo-Karo <i>et al.</i> (2019)
2	<i>G. balica</i>	8	5	Kuinon	Atroviridin, Benzoquinone, atrovirinone, Depsidone & atrovirisidone.	Akar		
3	<i>G. bancana</i>	15	9	Flavonoid, Xanton, As. Organik	Morelloflavone, Atrovirisidone B, Naringenin, Succinic acid, Garcinol, Camboginol, Isogarcinol, Garcineflavone A, & Garcineflavanol A	Kulit Batang		Purbowati & Ersan (2017); Elsaviaristi (2015); Hartati <i>et al.</i> (2014)
5		5	2	As. Organik	5-hidroksi-4-fenilkumarin & 7-hidroksi-4-fenilkumarin	Buah	Antioksidan, Sitosiksik, Antimikroba, Antifungji, Antimalaria, Antileukimia, Hipoglisemik	Muharni (2010); Muharni <i>et al.</i> (2009)
2		4	8	Kalkon, Flavonoid, As. Organik, & Fenol	5'-bromo-2'-hidroksi-4, 4', 6'- trimetoksi chalkon, dulcosiflavan, 5,7-dihidroksi-(1,2-dihidroksi-3-metilbutenil-3)-4-fenilkumarin, & 2, 4, 6-Trihidroksi benzofenon	Kulit Batang		
		2	2	Terpenoid	Triterpenoid & lupeol	Ranting		
		1	1	Terpenoid	Lupeol	Daun	Antioksidan	
		1	1	Fenol	Epikatekin, Garcinol, Isogarcinol (-)-mellein	Batang Ranting dan daun		
		8	8	Kalkon				
		15	15	Fenol	8-hydroxy-6-methoxy-3-n-pentylisocoumarin			
		8	8	Glikosida	Blumenol C-O-β-D-glucoside	Ranting dan daun	Antibakteri	Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)
		15	15	Flavonoid	Quercetin 3-O-α-L-rhamnoside & Kaempferol 3-O-α-L-rhamnoside			
		15	15	Terpenoid Sterol	Lupeol			
		15	15	Terpenoid Xanton	Stigmasterol Triterpenoid			
		15	15	Xanton	Xanton teroksigenasi, Xanton terpenilasi	Ranting dan daun		
		15	15	Benzofenon	Benzofenon polisoprenilasi	Ranting dan daun	Antikanker, Antioksidan, Antimikroba, Sitosiksik, & Antimalaria	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Muharni <i>et al.</i> (2011)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
4	<i>G. beccari</i>	23	11	Xanton & Fenolik	Cowanin, cowanol, cowaxanton, Forbesione, Forbexanton, Alkaloid, Flavonoid, Saponin, Steroid, Tanin, & Fenol	Buah	Antioksidan, sitotoksik, & Antibakteri	Alen <i>et al.</i> (2008); Dahlan <i>et al.</i> (2009)
5	<i>G. brevirostris</i>	13	6	Xanton	Rubraxanthone, trapezifolixanthone, alfa-mangostin, beta-mangostin, dulxanthone C, & osajaxanthone	Kult batang		
6	<i>G. candidula</i>	17	6	Biflavonoid	Antosianin, Tanin, Rubraxantone, trapezifolixanton, Alfamangostin, & Betamangostin	Kult Buah		
7	<i>G. celebica</i>	12	5	Fenol	Friedelin, Metanon, Tetrahidroksi, Triterpenoid, & Inoplyllin	Buah	Antikanker & Antibakteri	Hartati <i>et al.</i> (2014); Mian (2012)
			5	Xanton	Asam magniferolik, Benzefenol, Euphadienol, Kalosanton, Rubrasanton, Stigmasterol, Mangostin, Isobraktatin	Buah		Siridechakorn <i>et al.</i> (2012)
			6	Mangostin	$\alpha$ -mangostin, $\beta$ -mangostin, fuscaxanthone A, fuscxanthone C, 6-O-methylmangostanin, & cowaxanthone D	Buah	Antinflamasi & Antibakteri	Siridechakorn <i>et al.</i> (2012)
			3	Garcinol, F	Garciniacowol, garciniacowane, & parvifolio cowaxanthone & 1,7-dihydroxyxanthone norcowanin, cowanin, cowanol, cowagarcinone B, cowagarcinone D, cowagarcinone E,	Xanton		
			2	Flavonoid	Flavonoid, Biflavonoid, & Terpenoid			
				Steroid	Dihidroksisantron & isosanton			
				Terpenoid	Sitosterol, Stigmasterol, Friedelin, Betamangostin, & Tannin Friedelin and GarcihombronaneD	Kult Batang		
			3	Flavonoid	Flavonoid, Biflavonoid, & Terpenoid	Kult Batang	Antimikroba	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Elftita <i>et al.</i> (2009)
			2	Xanton	Dihidroksisantron & isosanton		Antikanker	
			5	Steroid	Sitosterol, Stigmasterol, Friedelin, Betamangostin, & Tannin		Antikanker & Antibakteri	Widiyowati & Rahman, 2010.
			2	Terpenoid	Friedelin and GarcihombronaneD	daun	Antiplasmodial	Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
8	<i>G. cornea</i>	5	2	Xanton	alfa-xanton & beta-xanton	Kulit Batang	Antimikroba & Antikanker	Muharni <i>et al.</i> (2011)
9	<i>G. cylindrocarpa</i>	13	3	Terpenoid, Flavonoid	Triterpenoid, Oxofriedelin, & Biflavonoid		Antiinflamasi	
10	<i>G. daedalanthera</i>	6	10	Fenol	Fenolat, Dimetylpiran, Piran, Hidroksi, Trimetoksi, Dihidroksi, Trihidroksi, Tetreametotoksi, Dihidroksi, & Tetrametil dihidro puran	Buah	Antileukimia, Hipoglisemik, Sitosoksik, Antimikroba, Antifungi, Anti HIV, & Antioksidan	Mahmiah & Ersam (2011)
11	<i>G. densivenia</i>	3	1	Xanton	1-hidroksi- 5,6,8-trimetolsi(3',3'-2,3)- dimetylpiranosantin, dikromensanton, & dimetylpiranosantan	Kulit Batang	Antimalaria	Eviati & Ersam (2014)
12	<i>G. dives</i>	11	2	Alkaloid, Fenol	Alkaloid & lignan	Daun	Antioksidan & Antibakteri	Erawati (2012)
13	<i>G. dulcis</i>	11	4	Flavonoid	Flavonoid, glikosida, terpenoid, & biflavonoid	Kulit Batang	Antiinflamasi	
			1	Xanton	Pyranojacareubin	Kulit Batang	Antibakteri & Antioksidan	Osorio <i>et al.</i> (2013)
			2	Flavonoid	Morelloflavone & O-methyl fukugetin			Sukandar <i>et al.</i> (2016)
			11	Xanton	Cowagarcinone A-E, cowaxanthone, cowanin, cowanol, 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,5-bis (3methyl-2- butenyl)xanthone, mangostinone, & fucoxanthone A	Cabang	Antibakteri & Antioksidan	Utami (2016)
			11	Xanton	Dulcisxanthone A	Daun	Antibakteri	Sukandar <i>et al.</i> (2016)
			11	Biflavonoid	1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2-(3-methyl-2- butenyl)xanthone	Buah	Antioksidan, Antiinflamasi	Ismanto (2014)
			7		Amentoflavone, fukugetin, volkensiflavanone, and flavanone-(1-3:11-8)-chromone, 1- 4' (flavanone- chromone), Dulcisbiflavonoid A, & Morelloflavone	Daun	Antimalaria	
			11	Biflavonoid	Podocarpusflavone A	Cabang	Antibakteri	
			11	Biflavonoid	Dulcisbiflavonoid A	Buah		

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
14	<i>G. excavata</i>	7	7	Mangostin	Clausenarin, Alkaloid carbazole, Clausine-K, Clausenolide-1-methyl, Xanthyletin, Dentatin, & Nordenatin beta-mangostin, cowanin, $\alpha$ -mangostin, cowanol, & isojacareubin Fuscaxanthone I, fuscaxanthone A, cowaxanthon, fuscaxanthone G, & 1,3,5,6tetrahydroxyxanthone	Buah	anti-inflamasi, antiplatelet, antiplasmoidal, antimikroba, antinociceptive & anti-imunomodulat or	Sharif <i>et al.</i> (2011)
15	<i>G. fusciformis</i>	10	5	Xanton	beta-mangostin, cowanin, $\alpha$ -mangostin, cowanol, & isojacareubin Fuscaxanthone I, fuscaxanthone A, cowaxanthon, fuscaxanthone G, &	Buah	Anti-inflamasi, antiplatelet, antiplasmoidal, antimikroba,	Nontakham <i>et al.</i> (2014)
16	<i>G. Forbesii</i>	2	2	Xanton	Forbexanthone, pyranojacareubin, and 1,3,7-trihydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-xanthone Gaudichaudiones A-H, gaudichaudic acids A-E, morellic acid, & forbesione Caudichaudic acids (F-I) & Gaudiospirolactone	Cabang	Antimikroba & Antiinflamasi	Mian <i>et al.</i> (2010)
17	<i>G. gaudichaudii</i>	20	15	Xanton	Guttiferone I, Isoxanthochymol, & guttiferone I	Daun	Antibakteri	Yang <i>et al.</i> (2015)
			5	Alkaloid	Gaudiospirolactone	Batang	Antikanker	
			3	Terpenoid	Kulit	Antibakteri & Antioksidan		
					Batang			
18	<i>G. griffithii</i>	11	6	Xanton	1,5-Dihydroxy-3,6-dimethoxy-2,7diprenylxanthone and 1,6-dihydroxyxanthone, 1,7-dihydroxyxanthone, 1,3,6,7tetrahydroxyxanthone and 1,3,5,6-tetrahydroxy xanthone, & Griffipavixanthone 1,3,5,6-Tetrahydroxy-7-(3-methylbut-2-enyl)xanthone and rubraxanthone	Kulit	Antibakteri	Lavaud <i>et al.</i> (2015)
			2	Xanton		Batang	Antibakteri & Antikanker	
			11		Garcinol, guttiferones K, I, J, M and N, Guttiferone I, guttiferone N, guttiferone J, Cambogin (isogarcinol) and camboginol (garcinol)	Daun		
			2	Terpenoid	Garcinol			
			2		Guttiferone E and isogarcinol Fukugicide, GB-1, and amentoflavone Morelloflavone, dihydromorelloflavone and isomorellic acid	Buah	Antioksidan & Antiinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)
19	<i>G. gummi-gutta</i>	21	1			Daun	Antikanker	
			2			Daun	Antioksidan	
			3	Biflavonoid		Kulit	Antiinflamasi batang	Stark <i>et al.</i> (2015)

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com- ound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
20	<i>G. Goudotiana</i>	7	7	Phloroglucinol s/Fenol	Goudotianone 1, 2, Garciniaalone, Parvifoliols A-G, Oblongifolin C, garcicowin B, & garciyunnannin	Buah	Antiinflamasi	Le et al. (2016); Mahamodo et al. (2014)
21	<i>G. hanburyi</i>	25	Asam Hidroksi	2alpha-Hydroxy-3beta-O-acetyl lup-20(29)-en -28-oic acid, 3-O-(40-O-acetyl)-aL arabinopyranosyloleonic acid, Betulinic acid, Messogenic acid, Gaudichaudic acid, Isogambogenic acid, Deoxygaudichaudione A, 7 methoxydesoxymorellin, 2-isoprenylforbesine 8,8a-epoxymorellic acid, Morellic acid (MA), 30-hydroxygambogetic acid (HGA), 3 0- hydroxyepigambogetic acid (HEGA), Isogambogenic acid (IGA), Episogambogenic acid (EIGA), Gambogenic acid (GNA), Gambogenic acid (GA), Epigambogenic acid (EGA), Desoxymorellin, Gambogenic acid, Hanburin, Forbesione, Dihydroisomorellin, Desoxygambogenin, & 2 a-Acetoxy-3 b-hydroxy-19 b-hydrogen-lup- 20 (29)-en-28-oic acid (2-acetoxyalphitolic acid), 2 a-hydroxy-3 b-acetoxy-19 b-Hydrogen-lup-20(29)-en-28-oic acid (3- acetoxyalphitolic acid), Betulinic acid, Betulin, & Stimasterol-3-O-b-D-glucopyranoside Gambogenin, Morellin dimethyl acetal, Isomorellin B, Morellic acid, Gambogenic acid,	Getah Ranting daun	Antikanker, Antibakteri Antiinflamasi	Lailati (2017); Yang et al. (2012); Deng et al. (2012)	
21	<i>G. hanburyi</i>	18	Xanton	Biflavonoid	Gambogenin, Isogambogenin, Desoxygambogenin, Gambogenin dimethyl acetal, Gambogelic acid, Hanburin, Gambogenic acid, Isomorellin, Morellic acid, Desoxymorellin, 10-methoxy gambogenic acid, 10-methoxygambogenic acid, 10-ethoxy gambogenic acid	Getah	Antikanker	Hemshekhar et al. (2011)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
22	<i>G. hombroniana</i>	25	5	Fenol	2,3',4,5'-Tetrahydroxy-6-methoxybenzophenone, 2,3,4,4'-tetrahydroxy-6-methoxybenzophenone, and 2,3,4,6-tetrahydroxybenzophenone	Batang	Antibakteri, Antioksidan	Klaiklay <i>et al.</i> (2013); Jamila <i>et al.</i> (2014)
23	<i>G. livingstonei</i>	13	5	Flavonoid	3,3',4',5',7-Hexahydroxyflavone, 3,3',5',5',7-pentahydroxyflavanone, & 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone	Batang	Antinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)
24	<i>G. macrophylla</i>	4	2	Xanton	Cambogic acid and mangostin	Daun		Klaiklay <i>et al.</i> (2013)
25	<i>G. maingayi</i>	2	2	Xanton	Garcilimonbrones A-D	Ranting		
26	<i>G. malaccensis</i>	8	3	Xanton	1,3,6-Trihydroxy-7-methoxy-2,8-(3-methyl-2butenyl) xanthon, & 1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone,	Batang		
26	<i>G. malaccensis</i>	8	4	Biflavonoid	Volkensiflavone, volkensiflavone-7-O-Orhamnopyranoside, 4''-O-methylvolkensiflavone, volkensiflavone-7-Oglucopyranoside, morelloflavone, 3''-O-methylmorelloflavone, and morelloflavone-7-Oglucopyranoside	Batang	Antibakteri	Jamila <i>et al.</i> (2014)
27			13	Xanton	1,4,5-Trihydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-9Hxanthan-9-one, 1,4,5-Trimetkoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-9Hxanthan-9-one, 3,4-dihydro-6,11dihydroxy-2,2-dimethyl-pyran[3,2-c]xanthan-7(2H)-one, and 6,11-dihydroxy-3-[3,2-c]xanthen-7(2H)-one, and Garcilivin A-C	Buah	Antibakteri & Antioksidan	Lailati (2017); Ambarwati (2018); Mono <i>et al.</i> (2011)
28			4	Benzophenon	Garbogiol, isogarcinol, xanthochymol, & guttiferone E	Batang	Antibakteri	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Utami (2016)
29			2	Benzophenon	Isoxanthochymol and camboginol	Kulit batang	Antibakteri & antinflamasi	Acuna <i>et al.</i> (2012)
30			6	Benzophenon	Mangaphenone, xanthochymol, garcinol, garcimangosone D, isoxanthochymol, & trimethoxy benzophenon	Buah	Antibakteri & antinflamasi	See <i>et al.</i> (2014)
31			2	Xanton	$\alpha$ and $\beta$ -Mangostin	Kulit batang	Antibakteri	Taber <i>et al.</i> (2012)

No	Species (Species)	Rincian jumlah senyawa (A Total Number of Compound)	Golongan senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
6	Xanton	1,5,8-Trihydroxy-3-methoxy-2[3-methyl-2butenyl] xanthone, and 1,6-dihydroxy-3-methoxy-2[3-methyl-2-butetyl]xanthone, cambogic acid, mangostin, & gertanin	Daun	Antikanker, Antibakteri	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Zhao <i>et al.</i> (2012); Xu et al. (2014)		
27	<i>G. mangostana</i>	66	Xanton & Antosianin	Mangostinone, $\alpha$ , $\beta$ and $\gamma$ -mangostins, gartanin, garcinone E, 1,5-dihydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-3-methoxy xanthone, and 1,7-dihydroxy-2-(3methylbut-2-enyl)-3-methoxyxanthone, 1,3,7-Trihydroxy-2-(3-methyl-2-butetyl)-8-(3hydroxy-3-methyl-2-butetyl)-xanthone, 1,3,8-trihydroxy-2-(3-methylbutanoyl)-xanthone, 2,4,6,7-Tetrahydroxyxanthone, 3,4,5,3'-tetrahydroxybenzophenone, and 2,4,6,3',5' penta hydroxybenzophenone, D, gartanin, xanthone I, and $\gamma$ -mangostin 2,4,6,7-Tetrahydroxyxanthone, 3,4,5,3',5' penta hydroxybenzophenone, garcinones C and D, guttiferone A, xanthochynol, and guttiferone E	Kulit buah	Antioksidan & Antibakteri	Xu <i>et al.</i> (2014); Murphy <i>et al.</i> (2019)
5	Benzophenon			Guttiferone A, xanthochynol, and guttiferone E	Buah	Antiinflamasi	Acuna <i>et al.</i> (2012)
1	Benzophenon			Xanthochynol	Kulit batang	Antibakteri	Acuna <i>et al.</i> (2012)
28	<i>G. mammii</i>	10	6	Manniflavanone, morelloflavone, and O-methyl fukugetin, GB-1, GB-2, and maniflavanone	Kulit batang	Antiinflamasi & Antibakteri	Trisuwani <i>et al.</i> (2013)
		3		GB-1, GB-2, and maniflavanone	Daun, Benih		
29	<i>G. merguensis</i>	5	5	Xanton	GB-1a, GB-2a, (+)-morelloflavone, (+)- volkensiflavone, & ammentoflavone	Akar	Antioksidan & Antibakteri
30	<i>G. microcarpa</i>	5	5	Xanton	Fukugetin, fukugiside, GB-1a, GB-2a and GB1a 7'',O- $\beta$ -D-glucoside, and I-5, II-5, I-7, II-7, I-3', I-4', II-4' - heptahydroxy- [I-3,II-8]-flavanonyl- flavones	Akar	Pandey <i>et al.</i> (2015)
31	<i>G. microphylla</i>	10	2	Xanton	biflavonoids, beta-xanthones, benzophenones, & flavonoids	Daun	Antikanker
		4	4	Mangostin	Guttiferone, guttiferone G, Biphenyls, acyl phloroglucinols, depsidones & terpenoids	Buah	Antimikroba
						Akar	Antioksidan

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
32	<i>G. minahassensis</i>	5	5	Xanton	garcimultiflорone A, garcimultiflорone B, 13-hydroxy garcimultiflорone B, & garcimultiflорone C	Batang	Antioksidan & Antimikroba	Acuna <i>et al.</i> (2012)
33	<i>G. minutiflora</i>	6	5	Benzophenon	4,6,4'-Trihydroxy-2,3-dimethoxy-3propenylbenzophenone	Kulit Batang	Antioksidan, Antibakteri, & Antimalaria	Widyowati & Rahman (2010)
34	<i>G. miquelii</i>	10	10	Xanton	13,14-Didehydroxyisogarcinol, garcimultiflорone A, garcimultiflорone B, 13-hydroxy garcimultiflорone B, and garcimultiflорone C	Buah	Antibakteri & Antimikroba	Trisuwant <i>et al.</i> (2013)
35	<i>G. morella</i>	13	1	Benzophenon	Merguenone, 1,5-dihydroxy-60-methyl-60-(4methyl-3-pentenyl)- pyran(20,30:3,2)-xanthone, subelliptone H, 8-deoxygartanin, theedaxanthone A, mortusignin G, 6-deoxyjacareubin, 1,3,5-trihy- droxy-4,8-di(3-methylbut-2-enyl)-xanthone, rheediachromenoxyxanthone, and 6deoxyisojacareubin	Batang	Antibakteri & Antimikroba	Foutsa <i>et al.</i> (2015)
36	<i>G. nervosa</i>	6	1	Xanton	Morellin	Benih	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
37	<i>G. nigrolineata</i>	10	8	Biflavonoid	Cambogic acid and mangostin Garcinol Dihydromorelloflavone, morelloflavone-7'',-beta-glucoside, fukugetin, and fukugiside Fukugicide, GB-1, GB-2, GB-1a, and amentoflavone	Dauh Dauh Batang Dauh	Antitiflamasi	Aravind <i>et al.</i> (2016)
			2	Biflavonoid	Heptahydroxy-[1-3, II-8]-flavanonyl flavones and I-3, II-3, I-5, II-5, I-7, II-7, I-4', II-4'octahydroxy [I-2', II-2'] biflavone	Dauh	Antibakteri, Antioksidan, & Antitiflamasi	Arwa <i>et al.</i> (2015)
			1	Xanton	Nervosaxanthone	Kulit batang Dauh	Antioksidan	Dahlam <i>et al.</i> (2009); Xu <i>et al.</i> (2016); Muhamari <i>et al.</i> (2009)
			3	Flavonoid	Nervosin, irigenin, and 7-methyl tectoirigenin Nigrolinae xanthones I-S, Nigrolinae xanthones A-I, 1,3,5-trihydroxy-4-(3hydroxy-3-methylbutyl)xanthone, 1,3,7-trihydroxy-2-(3-hydroxy- 3-methylbutyl)xanthone, 6deoxyjaacreubin, morusignin C, 1,5-dihydroxy-6',6' - dimethylpyranol[2',3':3,2]xanthone, & tovoxanthone Nigrolinae biphenyls A & B	Ranting Dauh	Antioksidan, antibakteri, sitotoksik dan antimalaria	
			2	Biphenyls		Dauh		

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
38	<i>G. nitida</i>	6	6	Xanton	1,6-Dihydroxy-5-methoxy-6,6dimethylpyrano [2',3':2,3]-xanthone, inophyllin B, osajaxanthone, 3-isomangostin,& rubraxanthone	Kulit Batang	Antibakteri & Antioksidan	Ee <i>et al.</i> (2012)
39	<i>G. paucinervis</i>	13	4 3 5 1	Xanton	Paucinones A, B, C, & D Paucinervins H-J Paucinervins E, F, G, H, & I Pauciisoflavone A	Dau Dau Bibit steam	Antibakteri	Hu <i>et al.</i> (2014)
40	<i>G. parvifolia</i>	32	11	Despidones Pholoroglucino Flavonoid	Parvixanthones A-I, Parvixanthone A and rubraxanthone Garcidepsidone A, B, C, & D Parvifolidones A & B Parvifolios A, B, C, D, E, F, & G Parvifolios B, C, D, & E Nigrolinaisoflavone A 4-(1,1-Dimethylprop-2-enyl)-1,3,5,8tetrahydroxanthone penangianaxanthone, cudatricusxanthone H, macluraxanthone C, & gerontoxanthone C	Batang Dau Ranting Ranting Dau Dau	Antiradikal Antimikroba Antioksidan Antikanker Antibakteri	Xu <i>et al.</i> (2014)
41	<i>G. penangiana</i>	4	4	Xanton	Garcinopacobenzophenone, guttiferone F, Doritunggarcinones A & B	Dau	Antibakteri	Meehai <i>et al.</i> (2016)
42	<i>G. pictorhiza</i>	4	4	Xanton	Porxanthone A & dulxanthone E, F, G	Kulit batang	Antibakteri	Tantapaku <i>et al.</i> (2012)
43	<i>G. porrecta</i>	4	4	Xanton	Morelloflavone, O-methylfukugetin, volkenensisflavone, amentoflavone, & 4''-methoxyamentoflavone	Kulit batang	Antiradikal Antimikroba	Meesatul <i>et al.</i> (2016)
44	<i>G. prainiana</i>	5	5	Biflavonoid	Preussianone, Fukugetin & O-methyl fukugetin	Dau	Antiradikal Antimikroba	On <i>et al.</i> (2016)
45	<i>G. prussii</i>	3	3	Biflavonoid				Messi <i>et al.</i> (2012)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
46	<i>G. riedeliana</i>	22	3	Xanton	Rubraxanthone, isocowanin, & isocowanol	Ranting	Antibakteri	Meechai <i>et al.</i> (2016)
47	<i>G. rigida</i>	3	19	Xanton	Scortechinones Q-T, scortechinones U-X, scortechinones A-F, H, I, M, L, and P Yahyxanthone, Musaxanthone, & asmayxanthone	Batang	Antiinflamasi & Antibakteri	Meechai <i>et al.</i> (2016) Vo <i>et al.</i> (2012)
48	<i>G. schomburgkiana</i>	34	8	Xanton	6-O-Demethyloliverixanthone, schomburgxanthone, cowarin, cowanol, fuscaxanthones A and B, 3isomangostin hydrate, and 1,7-dihydroxyxanthone	Dau	Antibakteri	Vo <i>et al.</i> 2012
49	<i>G. scortechinii</i>	27	15	Xanton	Schomburgxanthone A Euxanthone and gentisein Schomburgkianones A, B, C, D, E, F, G, & H GB-1a, GB-2a, morelloflavone, and volkensiflavone	Akar Battang Buah	Antibakteri Antiinflamasi	Sulkandar <i>et al.</i> (2016); Meechai <i>et al.</i> (2016); Le <i>et al.</i> (2016)
			10	Benzophenon	Despidones	Schomburgdepsidones A & B	Akar	Antioksidan
			4	Biphenyls	Schomburgbiphenyl, Acuparin, nigrolineabiphenyl B and Garcibiphenyl C. Oblongifolin C, garcicowin B, and gaciyyunnamin	Kulit battang	Sulkandar <i>et al.</i> (2016)	
			3	Phloroglucinols	Kaempferol, dihydrokaempferol and (-)- 5,7,3',5'-tetrahydroxyflavanone	Buah	Antikanker	
			3	Flavonoid	Scortechinones (A and B)	Kulit pohon	Antioksidan	
			2	Benzophenon	Scortechinones (A, B, D, F, I and J), 400,500- dihydro-1,5-dihydroxy-60,60-dimethylpyrano (20,30,6,7)-400,400,500-trimethylfuran (200,300,3,4)-xanthone, Scortechinones (L, M, N, O and P)	Getah	Antibakteri & antiinflamasi	
					Scortechinones (Q-T), Scortechinones (U-X), Scortechinones (A and B)	Kulit battang	Antibakteri	
					Scortechinones (Q-T), Scortechinones (U-X), Scortechinones (A and B)	Buah	Hemshekhari <i>et al.</i> (2011)	

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
50	<i>G. SMEATHMANNII</i>	20	13	Xanton	Smeathxanthone A, B, Cheffouxanthone, 1,5-dihydroxyxanthone, 1,3,5-trihydroxyxanthone, bangang xanthone A, smeathxanthone B, & smeathxanthone A, 1,3,5,8-Tetrahydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-4-(3,7dimethylocta-2,6-diényl)xanthone, cheffouxanthone, smeathxanthone A, smeathxanthone B, and ananixanthone Cheffouxanthone , smeathxanthones A, and smeathxanthone , smeathxanthones B, and smeathxanthones B	Kulit batang	Antibakteri	Foutsa <i>et al.</i> (2015)
51	<i>G. SEMSEII</i>	11	2	Benzophenon	Guttiferone I and isoxanthochymol	steam bark	Antioksidan	Foutsa <i>et al.</i> (2015)
52	<i>G. SOLOMONENSIS</i>	5	2	Benzophenon	Guttiferone I and isoxanthochymol	Kulit akar	Antiinflamasi	Lavaud <i>et al.</i> (2015)
53	<i>G. SPECIOSA</i>	9	4	Benzophenon & Xanton	Semsinones A, B, C, Smeathxanthone A, B, Smeathxanthone A & B Guttiferones O, P, Gutififerone E and Xanthochymol, & Garcinol Garciosaphenone Friedolanostanes, 3 a-hydroxy-16 a 23 a-epoxy-17,14-friedolanostan-8,14,24-trien-26-oic acid, 3 a,23 a-dihydroxy-8 a 9 a-epoxy-17,14-friedolanostan-15-oxo-24-en-26-oic acid, 3 a 23 alpha-dihydroxy-17,4-friedolanostan-15-oxo-8(14),24-dien-26-oic acid, 3 b 9 adihydroxylanost-24-en-26-al, 3 b-hydroxy-23 -oxo-9,16-lanostadien-26-oic acid Garcinol, gutififerone A, xanthochymol, & gutififerone E	Batang	Antibakteri	Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)
54	<i>G. SPICATA</i>	23	9	Biflavonoid	GB-1, GB-1a, GB-2a, and fukugetin, Fukugicide, GB-1, GB-2, GB-1a, and amentoflavone	Dau	Antiinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)
			8	Flavonoid	Fukugetin and 3-O-methyl fukugetin, Fukugiside, Volkensiflavone, spicataside, biflavonoid glycoside, GB-1a, and GB-2a Cambogic acid and mangostin	Kulit batang	Antioksidan	
			2	Xanton		Dau	Antibakteri	

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
55	<i>G. subelliptica</i>	44	11	Xanton	Garcinialiptone A, garcinialiptone B, Garcinaxanthone C, 1,2,5-trihydroxyxanthone, 2,6dihydroxy-1,5-dimethoxyxanthone, and 1,2dihydroxy-5,6-dimethoxyxanthone, 2,5-Dihydroxy-1-methoxyxanthone, 1-	Batang	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
56	<i>G. tetrandra</i>	10	10	Benzophenon	Omethylsynphoxanthone, garciniaxanthone E synphoxanthone, and subelliptenone A, & E-O-Dimethylsynphoxanthone 1,4,5,6-Tetrahydroxy-2-(1,1-dimethyl-2-propenyl)7,8,-di-(3-methyl-2-butenyl) xanthone, and 1,2,5,6tetrahydroxy-4-(1,1-dimethyl-2-propenyl)-7-(3methyl-2-butenyl) xanthone, subelliptenones A and B, Subelliptenones C, D, E, F, G, H, & I	Kult akar	Antimflamasi	Pandey <i>et al.</i> , 2015
57	<i>G. tetralata</i>	5	5	Biflavonoid	Garcinialiptone A, garcinialiptone B, (-) cycloanthochymol, garcinialiptone C, garcinialiptone D, xanthochymol, isoxanthochymol, and cycloanthochymol Podocarpusflavone A, 2R,3S-5,7,4',5'',7'',3'',4''-Heptahydroxy flavanone[3-8''] flavone, and 5,7,4',5'',7'',3'',4''heptahydroxy[3-8''] biflavanone	Batang	Antioksidan	Pandey <i>et al.</i> (2015)
			10	Phloroglucinol s	Garcinielliptone A, B, C and D, K, L, M, R, P & garsubellins A	Akar	Antibakteri	Jayanti & Ersam (2018); Ihnsany & Ersam (2018)
				Fenol	Mangostin, proton, diklorometana, santon terpenilasi singlet, proton metilen, proton metin, terpenoid, fenolat, alkaloid, & steroid	Buah	Antioksidan, antibakteri & antimalaria	Guo <i>et al.</i> (2011)

No	Species (Species)	Rincian jumlah senyawa (A Total Number of Compound)	Golongan senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
58	<i>G. urophylla</i>	6	6	Xanton	7-Hydroxydesoxymorettin, isocaledonixanthone D, gaudichudione H, 1,7-dihydroxy-3-methoxy-2-(3methyl-2-butenyl)xanthone, 1,5-dihydroxy-3methoxy-2-(3-methyl-2butenyl)xanthone, and 1,3,7trihydroxy-2-(3-methyl-2-butetyl)xanthone	Daun	Antibakteri Khalid <i>et al.</i> (2007)
59	<i>G. vieillardii</i>	13	13	Xanton	Vieillardiixanthones B and C, pancixanthones A, B, 1,6-dihydroxyxanthone, pyranojacareubin and 5,6O-dimethyl-2-depenylrhedioxanthone, 1,6-Dihydroxyxanthone, pancixanthone A, isocudraniaxanthone B, isocudraniaxanthone A, 2depenyl rhedioxanthone B & 1,4,5,6-trihydroxyxanthone Globuxanthone, subelliptenone H, subelliptenone B, 12b-hydroxy-des-D-gareigerin A, 1-Omethylglobuxanthone, and symphoxanthone	Kulit batang	Antibakteri Hay <i>et al.</i> (2008)
60	<i>G. villosiana</i>	6	6	Xanton	1,4,6-Trihydroxy-5-methoxy-7-prenylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7-prenylxanthone, 1,2,5,6tetrahydroxy-7-geranylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7,8-diprenylxanthone, 1,3,5,6tetrahydroxy-4,7,8-triprenylxanthone, garciniaxanthone E, & 6-prenylapigenin	Kulit batang	Antibakteri Guo <i>et al.</i> (2011)
61	<i>G. wichmannii</i>	7	7	Xanton	Cambogic acid & mangostin	Daun	Antimikroba, Antioksidan, & Antibakteri Pandey <i>et al.</i> (2015)
62	<i>G. wightii</i>	7	1	Benzophenon	Garcinol Fukugicide, GB-1, GB- 2, GB-1a, and amentoflavone	Daun	Antioksidan Antibakteri Antioksidan Antiinflamasi Pandey <i>et al.</i> (2015)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
8	Biflavonoid			Volkensiflavone, morelloflavone, GB-1, and GB-1a, 3'-8'', 3'', 4'', 5'', 7'', Heptahydroxy biflavanone, 3-8'', 4'', 4'', 5'', 5'', 7-7'1hexahydroxy biflavanone, fukugenin, and volkensiflavone	Buah	Antiinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)	
3	Flavonoid			GB-2a glucoside, GB-2a, and fukugenin GB-1a, GB-2, volkensiflavone, fukugiside, xanthochymoside, and morelloflavone	Akar Kulit batang Daun	Antiinflamasi Antibakteri		
6	Xanton			Cambogic acid and mangostin				
2				1,4,5,6-Tetrahydroxy-7,8-di(3-methylbut- 2enyl)xanthone, 1,2,6-trihydroxy-5-methoxy-7 (3-methylbut-2-enyl)xanthone, and 12 beta- hydroxy-Dgarcigenin	Batang			
3				1,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxyxanthone and 1,5,6trihydroxy-7,8-di(3-methyl-2-butenyl)- 60,60-dimethylpyrano(20,30;3,4)xanthone, 1,5,6- Trihydroxy-7-(3-methyl-2-butetyl)-8- (3hydroxy-3-methylbutyl)furanol(2',3';3,4) xanthone, 1,5,6-trihydroxy-7-(3-methyl-2- butenyl)- 8-(3hydroxy-3-methylbutyl)-6',6' dimethylpyran(2',3';3,4)xanthone, 1,5,6- trihydroxy-7-(3-methylbutenyl)-8-(3- hydroxy-3-methylbutyl)-5'(1hydroxy-1- methylethyl)4', 5'dihydrofuran(2',3';3,4) xanthone, 1,2, 5, 4'-tetrahydroxy-4-(1,1- dimethylallyl)-5'(2-hydroxypropan-2-yl)-4', 5'dihydrofuran- (2', 3': 6, 7)xanthone, 1, 3, 5, 6tetrahydroxy-7-geranyl)xanthone, and 1, 4dihydroxy-6', 6'- dimethylpyran(2', 3': 5, 6) xanthone, 1,7-dihydroxyxanthone and 1,5,- dihydroxyxanthon				
63	<i>G. xanthochymus</i>	39	10		Kulit buah			
7	Xanton			1,4,6-Trihydroxy-5-methoxy-7- prenylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7- prenylxanthone, 1,2,5,6tetrahydroxy-7- geranylxanthone, 1,4,5,6- tetrahydroxy-7,8- diprenylxanthone , 1,3,5,6tetrahydroxy-4,7,8- triprenylxanthone, garenimaxanthone E, and 6- prenylapigenin	Ranting	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)	

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
64	<i>G.</i> <i>xiphianbannaen-</i> <i>nsis</i>	16	14	Xanton	Bannaxanthone H, 1,3,5,6-tetrahydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)xanthone, bannaxanthone F, garcinone C, 1,3,6,7-tetrahydroxy-8-(3-methylbut-2-enyl)xanthone, bannaxanthone G, bannaxanthone B, γ-mangostin, garcinone E, bananxanthone E, allanxanthone C, bannaxanthone D, 1,3,5,6tetrahydroxy-7-(3-methylbut-2-enyl)xanthone, xanthone V1a, and nigrolinexanthone V	Ranting	Antibakteri, Antinflamasi, & Sitosotksik	Chen <i>et al.</i> (2010)
			2	Benzopheno	Guttiferone E and xanthochymol	Ranting		
				n				