

Inhibition of Chitosan from Waste Shell of Cultivated “Soka” Crab (*Scylla* sp.) against Four Histamine-Forming-Bacteria Isolates in Tuna (*Euthynnus affinis*)

by Agustiana Agustiana

Submission date: 15-May-2023 10:26PM (UTC-0400)

Submission ID: 2094257957

File name: 8._A._Daya_Hambat_Kitosan_dari_Cangkang_Limbah.pdf (339.91K)

Word count: 3726

Character count: 23252

DAYA HAMBAT KITOSAN DARI CANGKANG LIMBAH BUDIDAYA KEPITING “SOKA” TERHADAP EMPAT ISOLAT BAKTERI PEMBENTUK HISTAMIN PADA IKAN TONGKOL (*Euthynnus affinis*)

Inhibition of Chitosan from Waste Shell of Cultivated “Soka” Crab (*Scylla* sp.) against Four Histamine-Forming-Bacteria Isolates in Tuna (*Euthynnus affinis*)

Siti Aisyah *, Agustiana, Rabiatal Adawyah, Candra

Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat
Jalan A. Yani Km 36 Banjarbaru

*Surel korespondensi: esah_iwaknyaman1961@yahoo.co.id

Abstract. The purpose of this study was to determine the inhibition of chitosan from crab cultivation waste “soka” (*Scylla* sp.) against histamine-forming bacteria in tuna (*Euthynnus affinis*). The formation of histamine on the cob was caused by bacteria that could produce the enzyme histidine decarboxylase to transform histidine into histamine. Several studies had described the ability of chitosan to inhibit the activity of histamine-forming bacteria. In this research, There were three stages. The first stage was characterization of chitosan from waste shell of cultivated “soka” crab. The second was isolation of bacteria producing histamine on the cob and the third was to test the activity of chitosan against bacteria producing histamine. Chitosan from waste shell of cultivated “soka” crab contained 10.07% water, 0.20 % fat, 1.42 % ash content, 3.18% protein, and 58.99 % degree of deacetylation. The isolation of bacterial symbionts on the cob re-examined in the formation of histamine thus obtained 4 isolates; that were *Serratia marcescens*, *Enterobacteriaceae* sp, *Enterobacter gergoviae* and *Citrobacter amalonaticus*. Testing of chitosan inhibition against bacteria *Serratia marcescens*, *Enterobacteriaceae* sp, *Enterobacter gergoviae* and *Citrobacter amalonaticus* obtained a clear zone, respectively, 0.54 ± 0.03 cm; 0.59 ± 0.01 cm; 0.41 ± 0.01 cm; and 0.40 ± 0.05 cm.

Keywords: chitosan, histamine, cob, bacteria, isolate

1. PENDAHULUAN

Pada ikan tongkol, proses bakteriologis akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun hasil penguraian gugus histidin menjadi histamin oleh enzim *histidine decarboxylase* yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri kelompok *enterobacteriaceae* atau bakteri marin pembentuk histamin. (Taylor & Alasvar, 2002). Banyak jenis bakteri yang mampu menghasilkan histidin dekarboksilase seperti *Proteus morganii* (*Morganella morganii*), *Hafnia alvei*, dan *Klebsiella pneumoniae* (Allen, 2004).

Penggunaan kitosan untuk pengawetan hasil perikanan dengan menggunakan larutan kitosan 1% dalam asam asetat 1% mampu menurunkan jumlah mikroba pada fillet ikan salmon yang disimpan pada suhu 4°C selama 6 hari (Nicholas, 2003). Sedangkan hasil penelitian Wang dalam Nicholas (2003), menunjukkan bahwa pemakaian larutan kitosan 0,5 - 2,5% efektif melawan *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, *Yersinia enterocolitica* dan *Escherichia coli* pada produk perikanan.

Pemanfaatan cangkang dari limbah budidaya kepiting soka masih belum maksimal. Cangkang kepiting yang lepas dari tubuhnya setelah proses

molting (pergantian cangkang) hanya dimanfaatkan sebagai pakan unggas dan sisanya dibuang percuma karena masih dianggap sebagai sampah budidaya. Untuk memaksimalkan potensi cangkang kepiting diperlukan pengolahan. Salah satunya adalah mengolah menjadi kitosan, karena usaha budidaya kepiting soka telah dikembangkan khususnya di Kalimantan Selatan.

Belum diketahui taraf konsentrasi optimal kitosan cangkang limbah budidaya kepiting soka guna menghambat kinerja bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase membentuk histamin pada ikan tongkol, sehingga diperlukan langkah penelitian untuk mengetahui karakterisasi ikan yang telah dilapisi (*coating*) larutan kitosan. Pada penelitian ini dipelajari karakteristik kitosan kepiting dari limbah budidaya kepiting soka, isolasi bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase pada ikan tongkol dan efektifitas kitosan terhadap bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase.

2. METODE

Bahan utama penelitian ikan tongkol (*Euthynnus affinis*) diperoleh di Tempat Pendaratan

ikan (TPI) Banjarmasin. Cangkang kepiting bakau (*Scylla* sp) diambil dari limbah budidaya kepiting soka di Desa Tanjung Mangkok Kepulauan Sebuku Kotabaru. Bahan penunjang penelitian adalah es curah, CH_3COOH , Pepton, Ekstrak khamir, Gliserol, Agar, Air laut steril, Tripton, Yeast extract, L-Histidin, NaCl, CaCO_3 , Agar, fenol merah.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *cool box*, pisau, timbangan digital, talenan, *homogenizer*, kertas cakram (paper disk), seaker, gelas piala, labu ukur 100 ml dan 50 ml, *magnetic stirrer*, tabung erlenmeyer, kertas saring, corong kaca, pipet mikro, tabung reaksi, kuvet, pipet volumetrik, pipet tetes, cawan *conway*, buret, botol pengencer, cawan petri, pH indikator, bunsen, inkubator, autoklaf, alat penghitung koloni (*coloni counter*), dan *stopwatch*.

2.1 Tiga Tahapan Penelitian

2.1.1 Karakterisasi kitosan (Somjit *et al.*, 2005) yang dimodifikasi

Cangkang kepiting diperoleh dari limbah budidaya kepiting soka dan kepiting segar sebagai kontrol. Cangkang kepiting di-demineralisasi dengan dicampur dengan asam klorida (HCl) dengan perbandingan antara pelarut dan padatan 20:1, dan dipanaskan pada suhu 90 - 95 °C selama 60 menit. Selanjutnya sampel dicuci dengan air destilasi sampai pH-nya netral. Setelah itu cangkang kepiting dalam larutan NaOH 3,5 N dengan perbandingan antara pelarut dan cangkang kepiting 20 : 1, dan dipanaskan pada suhu 90 - 95°C lama pemanasan 60 menit. Selanjutnya dilakukan pencucian sebanyak 2 kali dan disaring sehingga didapatkan padatan. Setelah dikeringkan dalam oven pada 60 °C selama 24 jam, dan diperoleh kitin. Kitin dideasetilasi dengan larutan 40 % NaOH selama 2 jam pada suhu 80 °C. Deasetilasi dilakukan dua kali untuk memastikan daya larut yang sempurna. Sampel yang diperoleh kemudian dicuci beberapa kali dengan air destilasi sampai netral dan mengering. Kitosan yang dihasilkan dikarakteristik fisika-kimianya yaitu rendemen, pH, viskositas, berat molekul, derajat deasetilasi, derajat putih, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan kadar abu.

2.1.2 Identifikasi bakteri pembentuk histamin (Mangunwardoyo *et al.*, 2007)

Setelah diperoleh isolat tunggal dari masing-masing sampel maka dilakukan identifikasi morfologi

dari bakteri untuk mengetahui jenis bakteri yang terdapat pada ikan tongkol. Isolat tunggal yang dihasilkan kemudian dilakukan seleksi bakteri pembentuk histamin. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Persiapan medium niven. Komposisi medium Niven yang dimodifikasi terdiri dari: 0,1% Tripton; 0,3% Yeast extract; 1,8 % L-Histidin-2HCl; 0,5% NaCl; 0,1% CaCO_3 ; 2,5 % Agar; dan 0,003% fenol merah, dilarutkan dalam 1 L akuades pada pH 6,4.

Seleksi bakteri pembentuk histamin (Mangunwardoyo *et al.*, 2007). Isolat – isolat bakteri ditumbuhkan dalam tabung berisi 5 ml Nutrient Broth (NB) diinkubasikan selama 18 jam pada suhu 37 °C, 125 rpm. Satu ose isolat digores ke dalam cawan petri yang berisi Nutrient Agar (NA) dengan metode kuadran, sampai diperoleh koloni bakteri tunggal. Bakteri yang diperoleh kemudian diinokulasikan ke dalam tabung miring Nutrient Agar (NA) dan diinkubasikan lagi selama 18 jam. Isolat–isolat berumur 18 jam tersebut kemudian diinokulasikan ke dalam cawan petri berisi medium Niven Agar termodifikasi pada pH 6,4 dengan 3 kali pengulangan, dan diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 37 °C.

Isolat-isolat bakteri yang masih tumbuh pada media dapat diasumsikan sebagai bakteri pembentuk histamin. Bakteri pembentuk histamin yang peroleh diambil 4 isolat bakteri berdasarkan jumlah terbanyak pada pengujian 1 dan disimpan dalam kulkas untuk pengujian pada tahapan berikutnya.

2.1.3 Pengujian aktivitas kitosan terhadap bakteri pembentuk histamin (Wangidjaja, 2004)

Persiapan pelarut dan larutan kitosan. Pelarut merupakan larutan asam asetat 1 % yang diencerkan menggunakan aquadest hingga volumenya mencapai 100 ml. Sedangkan larutan kitosan dengan konsentrasi 0,25 % dibuat dengan cara yaitu pertama-tama ditimbang kitosan yang masih dalam bentuk serpihan sebanyak 25 g, lalu dilarutkan dengan asam asetat 1% sampai membentuk larutan tersuspensi dan kemudian ditambahkan aquades hingga volumenya mencapai 100 ml.

Pengujian daya hambat bakteri. Cawan petri disediakan sebanyak 3 set dan masing-masing dibagi menjadi 6 bagian, dan masing-masing bagian diberi kode untuk pengujian zona hambat pelarut dan larutan kitosan. Kertas cakram disiapkan sebanyak 6 buah kemudian pelarut ditetaskan

masing-masing sebanyak 20 µL pada 3 kertas cakram, begitu juga untuk larutan kitosan diteteskan sebanyak 20 µL pada 3 kertas cakram, kertas cakram dikeringkan selama 1 menit. Kertas cakram (*paperdisk*) diletakkan pada media agar yang diinokulasi bakteri berdasarkan perlakuan. Cawan petri yang telah mengandung ekstrak pada posisi terbalik dimasukkan dalam inkubator pada suhu 40 °C selama 15 menit. Cawan petri diinkubasi pada 35–37 °C selama 16-20 jam.

Pengukuran zona hambat (Morales *et al.*, 2003). Aktivitas daya hambat bakteri dinyatakan berdasarkan zona bening yang dihasilkan di sekitar *paperdisk*. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri diukur dalam satuan mm dan dijadikan ukuran kuantitatif untuk ukuran zona hambat. Efektifitas dari bahan aktif, ditentukan oleh perbandingan diameter zona hambat dengan nilai standar.

2.2. Analisa Sampel

2.2.1 Kadar protein (AOAC 1999)

Proses destruksi pada suhu 410 °C selama 2 jam atau hingga didapatkan larutan jernih, didiamkan hingga mencapai suhu kamar dan ditambahkan 50 – 75 ml aquades. Disiapkan erlenmeyer berisi 25 ml larutan H₃BO₂ 4 % yang mengandung indikator (*bromocherosol green* 0,1 dan *methyl red* 0,1 % (2 : 1)) sebagai penampung destilat. Labu Kjeldahl dipasang pada rangkaian alat destilasi uap. Ditambahkan 50 ml Na₂(SO₄)₃ (alkali). Dilakukan destilasi dan destilat ditampung dalam erlenmeyer tersebut hingga volume destilat mencapai 150 ml (hasil destilat berwarna hijau). Destilat dititrasi dengan HCl 0,2 N, dilakukan hingga warna berubah menjadi abu-abu natural. Blanko dikerjakan seperti tahapan contoh. Pengujian contoh dilakukan triplo. Kadar protein ditentukan dengan rumus:

$$KP = \frac{(A - B) \times \text{normalitas HCl} \times 14,0007 \times 6,2}{W(g)} \times 100\%$$

2.2.2 Kadar lemak (AOAC 1999)

Labu lemak yang telah dikeringkan di dalam oven (105 °C) ditimbang hingga didapatkan berat tetap (A). Sebanyak 2 g contoh (C) dibungkus dengan kertas saring bebas lemak kemudian dimasukkan kedalam selongsong lemak. Selongsong tersebut dimasukkan kedalam tabung Soxhlet. Sebanyak 150 ml kloroform dimasukkan kedalam labu lemak. Contoh direfluks selama 8 jam, setelah pelarut sudah terlihat jernih

menandakan lemak sudah terekstrak semua. Selanjutnya pelarut yang ada pada labu lemak dievaporasi untuk memisahkan pelarut dan lemak, kemudian labu lemak dikeringkan dalam oven 105 °C selama 30 menit. Setelah itu ditimbang hingga didapatkan berat tetap (B). Kadar lemak dihitung dengan rumus:

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{B - C}{C} \times 100\%$$

2.2.3. Kadar abu (AOAC 1999)

Penentuan kadar abu didasarkan menimbang sisa mineral sebagai hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 °C. Cawan porselin dikeringkan di dalam oven selama satu jam pada suhu 105 °C, lalu didinginkan selama 30 menit di dalam desikator dan ditimbang hingga didapatkan berat tetap (A). ditimbang contoh sebanyak 2 g (B), dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dipijarkan di atas nyala api pembakar bunsen hingga tidak berasap lagi. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur listrik (*furnace*) dengan suhu 650 °C selama ± 12 jam. Selanjutnya cawan didinginkan selama 30 menit pada desikator, kemudian ditimbang hingga didapatkan berat tetap (C). kadar abu dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{(A + B) - A}{B} \times 100\%$$

2.2.4 Penentuan kadar air cara pengeringan (Thermogravimetri) (Sudarmadji *et al.* 2003)

Pada prinsipnya metode ini menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Cawan porselin dikeringkan dalam oven selama 30 menit lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang beratnya (A). Sampel dihaluskan atau dikecilkan ukurannya sampai homogen, diambil 2 g, dimasukkan ke dalam cawan porselin dan ditimbang seluruhnya (B). Cawan porselin berisi sampel dimasukkan ke dalam oven bersuhu 102 °C selama beberapa waktu sampai beratnya konstan yaitu apabila selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 g (C). Setiap kali penimbangan cawan porselin berisi sampel didinginkan terlebih dahulu dalam desikator selama 30 menit. Kadar air dihitung dengan rumus:

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{(B - C)}{(B - A)} \times 100\%$$

2.2.5 Derajat deasetilasi (Suptijah et al., 1992)

Spektrum infra merah kitin dan kitosan dapat dibuat dengan menggunakan spektrofotometer inframerah IR-408. Frekwensi yang digunakan berkisar antara 4000 cm^{-1} sampai dengan 400 cm^{-1} . Kitosan sebanyak 2 gram dilarutkan dalam 200 ml asam asetat 2 %. Larutan dikeringkan dengan suhu kamar di atas "glass platet", kemudian ditambahkan sodium hidroksida 1 N untuk menetralkan asam asetat yang telah ditambahkan sebelumnya. Larutan netral yang telah terbentuk di atas "glass platet" dicuci dengan air bersih. Setelah persiapan sampel selesai, selanjutnya derajat deasetilasi kitosan diukur menggunakan spektrofotometer inframerah. Pengukuran derajat deasetilasi berdasarkan kurva yang tergambar oleh spektrofotometer. Puncak tertinggi dicatat dan diukur dari garis dasar yang dipilih. Perbandingan absorpsi dilakukan pada panjang gelombang 1655 cm^{-1} dengan panjang gelombang 3450 cm^{-1} .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Kitosan

Kadar air kitosan masih berada dalam standar yaitu di bawah 12% menunjukkan kualitas proses pengeringan kitosan sudah baik (Tabel 1). Kumar (2000), mengemukakan bahwa kadar air kitosan dipengaruhi kualitas pengeringan yang dilakukan, waktu pengeringan dan seberapa banyak kitosan basah yang akan dikeringkan. Apabila kitosan dalam kondisi kering maka harus menghindari kelembaban lingkungan karena kitosan mudah menyerap air sehingga kitosan yang sudah jadi harus dikemas secara hermetis atau kedap udara.

Tabel 1. Karakterisasi kitosan dari kepiting

Parameter	Kadar (%)	Standar Mutu
Air	$10,07 \pm 0,06$	Maks. 12**
Lemak	$0,20 \pm 0,1$	$0,18 \pm 0,01^*$
Abu	$1,42 \pm 0,15$	Maks. 5**
Protein	$3,18 \pm 0,42$	Trace*
Derajat Deasetilasi	$58,99 \pm 0,03$	$\geq 70^{***}$

Keterangan: *Somjid et al.(2005); **BSN (2013); ***Suptijah et al. (1992)

Jumlah mineral yang terkandung dalam kitosan dapat dilihat dari kandungan kadar abunya. Proses demineralisasi pada pembuatan kitin meminimalisir kadar abu kitosan kepiting menjadi 1,42%. Komposisi utama mineral adalah kalsium

karbonat, untuk meminimalisir kadarnya dilakukan dengan dilarutkan dalam larutan asam klorida.

Kadar protein kitosan pada penelitian ini masih di bawah standar. Kondisi ini kemungkinan disebabkan proses deproteinisasi dan deasetilasi kurang sempurna. seperti pengadukan yang dilakukan tidak kontinyu sehingga menjadikan proses pelepasan protein menjadi terhambat. Penyebab lainnya adalah karena proses pencucian setelah deproteinisasi tidak berlangsung dengan baik, sehingga protein dalam kulit kepiting, udang galah dan putih tidak dapat tercuci secara maksimal.

Pencucian yang baik dilakukan sesaat setelah proses deproteinisasi selesai dalam keadaan sampel yang masih panas. Semakin rendah kadar protein kitosan maka kualitas kitosan semakin bagus, karena jika sisa protein dalam kitosan lebih banyak maka jumlah gugus amino bebas yang dapat mengikat asam semakin banyak pula, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas kitosan itu sendiri. Kulit udang mengandung protein yang terikat secara fisik dan kovalen, lemak terikat dengan protein atau lipoprotein, dan pigmen (4-keto dan turunan tiga 4,4'- diketo- β -karoten) terikat kompleks bersama kitin (Lee & Tan, 2002).


Derajat deasetilasi kitosan menunjukkan kitosan dari kepiting masih di bawah standar yaitu 58,99%. Kondisi ini kemungkinan kondisi protein yang masih ada karena proses demineralisasi dan deasetilasi masih kurang sempurna. Kitosan kepiting mempunyai derajat deasetilasi lebih rendah dibandingkan standar disebabkan kandungan mineral dari kitosan memungkinkan untuk gugus asetil masih terikat pada mineral yang masih ada. Suptijah (2004) mengemukakan derajat deasetilasi sangat penting untuk menentukan karakteristik kitosan dan akan mempengaruhi penggunaannya. Semakin tinggi derajat deasetilasinya semakin tinggi kemurnian nya artinya kitin dan kitosan sudah murni dari pengotornya yaitu protein, mineral dan pigmen serta gugus asetil untuk kitosan yang disertai kelarutannya yang sempurna dalam konsentrasi asam asetat 1,0 %.

3.2 Seleksi Bakteri Pembentuk Histamin

Penguji bakteri pada ikan tongkol di ambil 4 isolat bakteri pembentuk histamin yaitu *Serratia marcescens*, *Enterobacteriaceae* sp, *Enterobacter gergoviae* and *Citrobacter amalonaticus*.

Bakteri yang bersimbiosis pada ikan tongkol belum tentu seluruhnya adalah bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase. Dari seleksi pada media niven hanya 4 bakteri saja yang digunakan dan dilanjutkan untuk pengujian anti bakteri dari

kitosan. Hasil uji bakteri pembentuk histamine disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pengujian bakteri pembentuk histamin

Bakteri berpotensi menghasilkan *scromboid poison* (histamin), karena enzim histidin dekarboksilase yang dimilikinya. Bakteri ini termasuk famili *Enterobacteriaceae*. Jenis bakteri tersebut antara lain *Morganella morganii*, *Klebsiella pneumoniae*, *Hafnia alvei*, *Citrobacter freundii*, *Clostridium perfringens*, *Enterobacter aerogenes*, *Vibrio alginolyticus*, dan *Proteus* sp., *M. morganii*, *Proteus* sp., merupakan bakteri penghasil histamin lemah (Kusmarwati & Indriati, 2008; Indriati *et al.*, 2006). Niven *et al.* (1981) melaporkan bahwa bakteri penghasil histamin paling banyak pada ikan tuna segar, mahi-mahi, dan *mackerel* adalah *M. morganii*, diikuti oleh *Klebsiella pneumoniae*, *E. coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Proteus* sp., *Edwardsiella* sp., dan *Vibrio* spp. Keberadaan bakteri penghasil histamin (histidin dekarboksilase) merupakan penyebab peningkatan kadar histamin pada ikan (Keer *et al.*, 2002)

3.3. Aktivitas Kitosan terhadap bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase

Kitosan dianggap sebagai alternatif dalam menghambat kerja dari bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase. Hasil uji daya hambat kitosan terhadap bakteri disajikan pada Tabel 2.

Larutan kitosan keping mempunyai daya hambat lebih baik dari pelarut yaitu asam asetat ($p < 0,05$). Daya hambat tertinggi pada bakteri *Enterobacteriaceae* sp. kemungkinan tingkat kerusakan membran sel bakteri tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri yang lain.


Tabel 2. Daya hambat kitosan terhadap bakteri pembentuk histamine

Jenis Bakteri	Kontrol	Keping
<i>Serratia marcescens</i>	0,35±0,21 ^a	0,54±0,03 ^b
<i>Enterobacteriaceae</i> sp	0,24±0,04 ^a	0,59±0,01 ^b
<i>Enterobacter gergoviae</i>	0,48±0,10 ^a	0,41±0,01 ^b
<i>Citrobacter amalonaticus</i>	0,43±0,01 ^a	0,40±0,05 ^b

Keterangan :

Angka-angka pada baris yang sama untuk masing-masing parameter yang diikuti huruf *superscript* berbeda (a dan b) menunjukkan berbeda nyata ($p < 0,05$)

Kitosan dapat digunakan juga sebagai antimikroba tetapi sebagian dimanfaatkan untuk pembentukan film (Fernandez *et al.*, 2008). Karakteristik permukaan sel mikroba berkorelasi erat dengan aktifitas antibakteri kitosan, karena gugus asam amino dalam suasana pH asam (dibawah 6,5) yang muatan positif menyebabkan depolarisasi membran seluler mikroba, menyebabkan kematian bagi mikroba sebagai akibat terganggunya integritas dinding sel dari hubungan molekul (Kong *et al.*, 2010). Pada Gambar 2 disajikan pengujian daya hambat kitosan terhadap 4 isolat bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase.



Gambar 2. Uji daya hambat kitosan terhadap 4 isolat bakteri penghasil enzim histidin dekarboksilase

Mekanisme aktivitas antibakteri kitosan terjadi melalui interaksi gugus NH_3^+ glukosamin dengan permukaan sel yang bermuatan negatif (Eldin *et al.*, 2008). Adanya ketertarikan secara struktural antara dinding sel bakteri dan kitosan karena diketahui bahwa dinding sel bakteri mengandung

peptidoglikan yang struktur dasar rantai utamanya terdiri atas N-asetilglukosamin dan adanya β -glikan (Qujeq & Mossavi, 2004). Rafaat *et al.* (2008) berpendapat bahwa interaksi awal antara polikationik kitosan dan polimer dinding sel bermuatan negatif dipengaruhi oleh interaksi elektrostatis dan asam tekoat. Akibatnya, pengikatan kitosan ke polimer dinding sel memicu terjadinya efek seluler kedua, yakni destabilisasi dan kerusakan lebih jauh pada fungsi membran bakteri sehingga mengganggu fungsi membran sebagai pelindung dan mengakibatkan kebocoran komponen. Destabilisasi membran ini terjadi melalui mekanisme yang belum diketahui.

4. SIMPULAN

Kitosan berasal dari limbah budidaya kepiting soka dengan derajat deasetilasi 58,99% masih mampu menghambat aktivitas 4 isolat bakteri pembentuk histamin pada ikan tongkol yaitu *Serratia marcescens*, *Enterobacteriaceae* sp, *Enterobacter gergoviae* dan *Citrobacter amalonaticus*.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat atas bantuan dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [AOAC] Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. (1999). *Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16th Edition*. Washington, D.C.
- Allen, D.G., Jr. (2004). Regulatory control of histamine production in North Carolina harvested mahi-mahi (*Coryphaena hippurus*) and yellowfin tuna (*Thunnus albacares*): a HACCP-based industry survey [thesis]. Raleigh: Departement Food Science, North Carolina State University
- [BSN] Badan Standardisasi Nasional. (2013). *Kitosan-Syarat Mutu dan Pengolahan*. SNI 7949-2013. Jakarta: BSN
- Eldin, M.S.M., Soliman, E.A., Hashem, A. & Tamer, T.M. (2008). Antibacterial activity of chitosan chemically modified with new technique. *Trends Biomater Artif Organs*. 22:121-133.
- Fernandez, S.P., Lagaron, J.M., Hernandez, M.P. & Ocio, M.J. (2008). Characterization of Antimicrobial Properties on The Growth of *S. aureus* of Novel Renewable Blends of Gliadins and Chitosan of Interest in Food Packaging and Coating Applications. *International Journal of Food Microbiology*. 124(1): 13-20.
- Indriati, N., Rispayeni, & Heruwati, E.S. (2006). Studi Bakteri Pembentuk Histamin pada Ikan Kembung Peda selama Proses Pengolahan. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*. 1(2):117-123.
- Keer, M., Paul, L. & Sylvia, A. (2002). *Effect of Storage Condition on Histamin Formation in Fresh and Canned Tuna*. Commision by Food Safety Unit. www.foodsafety.vic.gov.au. [12 Agustus 2014]
- Kong, M., Chen, X.G., Xing, K. & Park, H.J. (2010). Antimicrobial Properties of Chitosan and Mode of Action: A State of The Art Review. *International Journal of Food Microbiology*. 144(1): 51-63.
- Kumar, M.N.R. (2000). A review of chitin and chitosan application. *J. Reac and Func Poly*. 46: 1-27.
- Kusmarwati, A. & Indriati, N. (2008). Daya Hambat Ekstrak Bahan Aktif Biji Pincung (*Pangium edule* Irenw.) terhadap Pertumbuhan Bakteri Penghasil Histamin. *Jurnal Pasca Panen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*. 3(1):29-35.
- Lee, V. & Tan, E. (2002). *Enzymatic Hydrolysis of Prawn Shell Waste for The Purification of Kitiin*. Departement of Chemical Engineering. Loughborough University.
- Mangunwardoyo, W., Sophia, R.A. & Heruwati, E.S. (2007). Seleksi dan Pengujian Aktivitas Enzim L-Histidine Decarboxilase dari Bakteri Pembentuk Histamin. *J. Makara, Sains*. 11(2):104-109.
- Morales, G.P., Mancilla, S., Paredes, A., Loyola, L.A., Gallardo, O. & Bourquez, J. (2003). Secondary metabolites of four medicinal plants from Nothem Chiles, antimicrobial activity, and biotoxicity against *Artemia salina*. *J. Chile Chem*. 48(2):35-41.
- Nicholas, T.A. (2003). *Antimicrobial Use of Native and Enzymatically Degraded Chitosan for Seafood Application*. Thesis. Maine: The University of Maine.
- Niven, C.F., Jeffrey, M.D. & Corlett, D.A. (1981). Differential Plating Medium for Quantitative Detection of Histamine Producing Bacteria. *Applied and Environmental Microbiology*. 321-322
- Qujeq, D. & Mossavi, S.E. (2004). Antibacterial activity of chitosan against *Escherichia coli*. *Bobol Med*. 7:1-12
- Rafaat, D., Kritine, V.K., Albert, H. & HansGeorg, S. (2008). Insight into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. *Appl and Environ Microbiol. Relation and Appl*. 74:3754-3773.
- Somjit, K., Ruttanapornwareesakul, Y., Hara, K. & Nozaki, Y. (2005). The cryoprotectant effect of shrimp kitin and shrimp kitin hydrolysate on denaturation and unfrozen water of lizardfish surimi during frozen storage. *Food Research International*. 38:345-355
- Suptijah, P., Salamah, E., Sumaryanto, H., Purwaningsih, S. & Santoso, J. (1992). Pengaruh Berbagai Isolasi Kitiin Kulit Udang Terhadap Mutunya. *Laporan Penelitian Jurusan Teknologi Hasil Perikanan*. Bogor: Fakultas Perikanan. IPB.

- Suptijah, P. (2004). Tingkat kitosan hasil modifikasi proses produksi. *Buletin Teknologi Hasil Perikanan*. 7(1):1-9.
- Taylor, T. & Alasalvar, C. (2002). *Seafoods: Quality, Technology, and Nutraceutical Applications*. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Wangidjaja, R.G. (2004). *Ekstrak Bunga dan Getah Semboja sebagai Antibakteri dan Bahan Aktif untuk Pergeseran Gigi Seri Kelinci*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 110 pp
-

Inhibition of Chitosan from Waste Shell of Cultivated “Soka” Crab (Scylla sp.) against Four Histamine-Forming-Bacteria Isolates in Tuna (Euthynnus affinis)

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 123deta.com 2%
Internet Source

2 repository.uinjkt.ac.id 2%
Internet Source

3 journal.ibrahimy.ac.id 2%
Internet Source

4 jurnal.untad.ac.id 2%
Internet Source

5 journal.universitaspahlawan.ac.id 1%
Internet Source

6 sinta.unud.ac.id 1%
Internet Source

7 zombiedoc.com 1%
Internet Source

8 ced.petra.ac.id 1%
Internet Source

anzdoc.com

9

Internet Source

1 %

10

barangdaurulang.blogspot.com

Internet Source

1 %

11

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

1 %

12

ejournal.kemenperin.go.id

Internet Source

1 %

13

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On

Inhibition of Chitosan from Waste Shell of Cultivated “Soka” Crab (Scylla sp.) against Four Histamine-Forming-Bacteria Isolates in Tuna (Euthynnus affinis)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7