

ANTIBACTERIAL POTENTIAL OF KAPUL FRUIT SKIN (*Baccaurea macrocarpa*) ON *Streptococcus sanguis*

Submission date: 12-Jun-2023 09:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2114045069

File name: ANTIBACTERIAL_POTENTIAL_OF_KAPUL_FRUIT_SKIN.pdf (703.26K)

Word count: 1447

Character count: 9044

ANTIBACTERIAL POTENTIAL OF KAPUL FRUIT SKIN (*Baccaurea macrocarpa*) ON *Streptococcus sanguis*

Norhayati*, Siti Ujrumiah*, Annisa Noviany*, Amy Nindia Carabelly**

PENDAHULUAN

Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) merupakan suatu lesi ulserasi yang terjadi secara berulang pada mukosa rongga mulut dengan gambaran klinis berupa ulser tunggal maupun multiple, dangkal, bulat lonjong, dan terasa sakit.¹ SAR terjadi sekitar 20% dari populasi dan 2% diantaranya mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Prevalensi SAR pada tahun 2014-2017 di Banjarmasin Kalimantan Selatan adalah 45, 42 %.^{2,3} Terdapat beberapa faktor pencetus yang dapat menyebabkan SAR, salah satunya adalah bakteri *Streptococcus sanguis*.⁴

Streptococcus sanguis merupakan bakteri gram positif anaerob fakultatif yang berperan sebagai bakteri pionir dalam proses kolonisasi bakteri yang ada di rongga mulut manusia dan sebagai agen penyebab terjadinya SAR.⁵ Bakteri ini sering dikaitkan dengan SAR¹³ baik sebagai patogen secara langsung atau sebagai stimulus antigenik dan mengakibatkan infeksi sekunder sehingga menyebabkan penyembuhan luka pada SAR terhambat.⁶

Bakteri *Streptococcus sanguis* dapat dibunuh oleh senyawa yang mengandung antibakteri seperti *Klorheksidin*.⁸ Klorheksidin merupakan gold standard sebagai antibakteri terhadap berbagai macam bakteri. Namun Klorheksidin memiliki efek samping dalam penggunaan jangka panjang sehingga perlu alternatif lain yang berasal dari tanaman, salah satunya adalah buah Kapul.⁹

Buah kapul (*Baccaurea macrocarpa*) termasuk dalam buah endemik khas Kalimantan dan hanya terdapat di wilayah Kalimantan. Kulit buah kapul yang terbuang hanya akan menjadi limbah sehingga perlu dimanfaatkan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis potensi antibakteri ekstrak kulit buah Kapul (*Baccaurea macrocarpa*) terhadap bakteri *Streptococcus sanguis*.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen laboratorium dengan *posttest-only with control group design*. Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat pada bulan April-Juni 2019. Penelitian didahului dengan uji fitokimia ekstrak kulit buah Kapul yang kemudian dilakukan pengujian aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah kapul menggunakan metode difusi dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, Klorheksidin sebagai kontrol positif dan Aquades sebagai kontrol negatif dengan empat kali pengulangan.¹⁵

Ekstraksi Kulit Buah Kapul

Ekstrak kulit buah Kapul dibuat dengan metode maserasi dengan menggunakan 1 kg kulit buah Kapul. Kulit buah Kapul dicuci terlebih

dahulu, setelah itu di anginkan dan diletakan di nampan alumunium lalu dimasukkan di dalam oven dengan suhu 40-50° C. Setelah kering lalu dihaluskan menggunakan blender dan diayak. Kemudian, timbang serbuk ekstrak kulit buah Kapul dan direndam dengan etanol 96% selama 3 hari sambil diaduk dan jika sudah selesai lanjut dengan menyaring dan diuapkan menggunakan waterbath.¹¹

Uji Fitokimia Kulit Buah Kapul

Uji Alkaloid. Uji ini menggunakan metode Gravimetri dengan cara menimbang ekstrak terlebih dahulu sebanyak 10 gr lalu tambahkan 200 mL asam asetat 10% dalam etanol, diamkan selama 4 jam lalu saring dan seperempat ekstrak diuapkan di waterbath, tambahkan ammonium hidroksida dan cuci endapan dengan ammonium hidroksida. Residu yang dihasilkan merupakan alkaloid.¹²

Uji Saponin. Uji ini menggunakan metode Gravimetri dengan cara menimbang 10 gr ekstrak lalu tambahkan 200 mL etanol 20%, uapkan dengan waterbath dengan suhu 55 C selama 4 jam, kemudian saring larutan dan residu diekstrak lagi dengan menguapkan di waterbath pada suhu 90 C hingga menjadi 40 mL, konsentrasi dituang dalam corong pisah dan ambil lapisan air lalu tambahkan 60 mL n-butanol, cuci dengan 10 mL NaCl 5% dan uapkan.¹²

Uji Tannin. Uji ini menggunakan metode Spektrofotometri dengan cara ekstrak ditimbang sebanyak 10 gr dilarutkan dengan aquades lalu ambil 50µL, tambahkan 400 µL K₄Fe(CN)₆ 0,8 mM + 400 µL FeCl₃ 0,1 M dalam HCL 0,1 M, tambahkan aquades hingga larutan menjadi 10 ml

dan biarkan selama 7 menit, kemudian ukur absorbansinya.¹³

Uji Flavonoid. Uji ini dilakukan dengan metode Spektrofotometri yaitu beberapa tetes larutan NaOH ditambahkan ke ekstrak kulit buah kapul sebanyak 500 μ l, ditambahkan HCL saat larutan berubah menjadi warna kuning dan kemudian tidak berwarna yang menandakan adanya flavonoid.¹⁴

Uji Antibakteri Kulit Buah Kapul

Metode yang digunakan untuk uji antibakteri kulit buah kapul adalah metode difusi cakram. Perlakuan menggunakan ekstrak kulit buah kapul dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, Klorheksidin sebagai kontrol positif dan Aquades sebagai kontrol negatif.

Pertama ekstrak diencerkan terlebih dahulu, lalu disk direndam di dalam ekstrak kulit buah kapul selama 3 jam. Setelah 3 jam, disk diletakkan pada media uji yang sudah diberi bakteri *Streptococcus sanguis* yang kemudian di inkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, dilakukan pengukuran zona hambatnya yaitu berupa zona bening disekitar disk menggunakan kaliper.¹⁶

HASIL PENELITIAN

Pengujian antibakteri kulit buah Kapul terhadap bakteri *Streptococcus sanguis* sudah lulus etik No. 185/KEPKG-FKGULM/EC/VI/2019 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Hasil uji fitokimia kulit buah Kapul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Kulit Buah Kapul


Senyawa	Mean \pm SD
Alkaloid	38,85 \pm 0.61
Saponin	23,22 \pm 1.02
Flavonid	21,00 \pm 0,66
Tannin	2.39 \pm 0.00

Tabel 2. Rata-rata daya hambat ekstrak kulit buah Kapul terhadap bakteri *Streptococcus sanguis*.

Konsentrasi(%)	N	Mean \pm Standar Deviasi
20%	4	0,37 \pm 0,09
40%	4	0,97 \pm 0,50
60%	4	1,10 \pm 0,08
80%	4	1,45 \pm 0,57
100%	4	1,77 \pm 0,05
K	4	1,72 \pm 0,12
A	4	0,30 \pm 0,00

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi maka semakin besar pula kemampuan daya hambat antibakteri kulit buah kapul.

Gambar 1. Hasil Uji Aktivitas Anti Bakteri Kulit Buah Kapul (*Baccaurea macrocarpa*) terhadap bakteri *Streptococcus sanguis*.



Shapiro wilk dengan hasil $p < 0.05$ yang menunjukkan data terdistribusi tidak normal. Uji dilanjutkan dengan uji *Kruskal-wallis* didapatkan $p=0,017$ yang berarti terdapat perbedaan bermakna. Uji dilanjut dengan uji *Mann - Whitney* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Uji statistic Mann - Whitney

Konsentrasi	20%	40%	60%	80%	100%	K	A
20%		0,017*	0,019*	0,019*	0,017*	0,019*	0,131
40%	0,017*		0,044*	0,017*	0,015*	0,017*	0,011*
60%	0,019*	0,044*		0,019*	0,017*	0,019*	0,013*
80%	0,019*	0,017*	0,019*		0,017*	0,019*	0,013*
100%	0,017*	0,015*	0,017*	0,017*		0,363	0,011*
K	0,019*	0,017*	0,019*	0,019*	0,363		0,013*
A	0,131	0,011*	0,013*	0,013*	0,011*	0,013*	

Keterangan :

* = Terdapat perbedaan yang Signifikan ($p < 0,05$)

K= Klorheksidin

A= Aquades

DISKUSI

Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa kulit buah Kapul mengandung senyawa alkaloid sebesar 35.851%, saponin sebesar 23.225%, flavonoid sebesar 21.000mg/mL. dan tannin 2.395mg/mL.

Penelitian antibakteri kulit buah Kapul menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah kapul dengan konsentrasi 40%, 60%, 80% dan 100% memiliki kemampuan antibakteri terhadap bakteri *Streptococcus sanguis*, dimana kemampuan antibakteri terbesar terdapat pada konsentrasi 100%. Hal ini, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi pula jumlah senyawa atau kandungan zat aktif di dalamnya.¹⁷

Kulit buah Kapul (*Baccaurea macrocarpa*) merupakan salah satu tanaman yang mempunyai aktivitas antioksidan dan antibakteri karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, tannin dan flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri.¹⁰

Saponin dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bakteri dengan cara menekan dinding sel bakteri, selain dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan bakteri, dinding sel yang tertekan dapat mengakibatkan kematian pada bakteri dikarenakan metabolisme bakteri yang terganggu.¹⁸ Saponin mengakibatkan kebocoran senyawa intraseluler karena memicu terjadinya penurunan pada tegangan permukaan sel bakteri dan menambah permeabilitas sel.²¹ Saponin sendiri terdapat pada bagian tanaman yang memiliki kemampuan untuk pertahanan seperti kulit buah.²²

Alkaloid yang merupakan senyawa metabolit sekunder dapat ditemukan pada tanaman, dimana alkaloid memiliki kemampuan untuk membunuh sel bakteri dengan cara mengganggu proses pembentukan peptidoglikan pada dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakteri tidak terbentuk dengan sempurna yang berakibat sel mengalami kematian atau nekrosis.²³ Alkaloid juga bisa mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri yang akibatnya sama seperti sebelumnya yaitu dinding sel bakteri tidak terbentuk sempurna dan akan mengalami kematian.²⁴

Tanin tergolong senyawa yang memiliki kemampuan mengganggu pertumbuhan bakteri dengan cara mengikat protein pembentuk dinding sel yang berakibat pertumbuhan dinding sel terhambat. Mekanisme tanin yaitu dinding sel yang telah lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid menyebabkan senyawa tanin mudah masuk ke dalam sel dan mengkoagulasi protoplasma sel bakteri.¹⁹ Tanin memiliki kemampuan toksisitas dengan cara membentuk

ikatan kompleks ion logam yang beakibat terjadinya kerusakan pada membran sel bakteri.²⁴

Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki kemampuan sebagai antivirus dan antiinflamasi.²⁰ Senyawa flavonoid memiliki kemampuan untuk merusak membrane sel bakteri yang berakibat cairan intraseluler keluar dari dalam sel bakteri. flavonoid memiliki kemampuan sebagai inhibisi pada sintesis DNA – RNA ikatan hidrogen dengan penumpukan basa asam nukleat. Flavonoid juga berperan dalam menghambat metabolisme energy.²¹ Senyawa flavonoid bersifat antibakteri dengan membuat sintesis asam nukleat, membrane sel dan metabolisme energy menjadi terhambat. Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat sintesis asam nukleat dilakukan melalui cincin B pada flavonoid yang mempunyai peranan penting dalam proses interkalasi atau ikatan hidrogen dengan menumpuk basa asam nukleat yang menghambat sintesis DNA dan RNA.²⁴

Ekstrak kulit buah Kapul konsentrasi 40%, 60%, 80% dan 100% terbukti bersifat antibakteri terhadap bakteri *Streptococcus sanguis*. Ekstrak kulit buah Kapul konsentrasi 100% berpotensi antibakteri yang setara dengan Klorheksidin. Ekstrak kulit buah Kapul berpotensi untuk dikembangkan sebagai salep antibakteri yang dapat mempercepat penyembuhan luka SAR.

KESIMPULAN

Ekstrak kulit buah Kapul berpotensi sebagai antibakteri terhadap bakteri *Streptococcus sanguis* pada konsentasi 40%, 60%, 80% ,100%, dan konsentrasi 100%

berpotensi antibakteri yang setara dengan klorheksidin.

8

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dana dari Ditjen Simbelmawa,

ANTIBACTERIAL POTENTIAL OF KAPUL FRUIT SKIN (*Baccaurea macrocarpa*) ON *Streptococcus sanguis*

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elearning.medistra.ac.id Internet Source	1%
2	e-skripsi.umpp.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uts.ac.id Internet Source	1%
5	Muhamad Najibufahmi, Muhammad Walid, Dewi Azizah. "Optimasi Ekstraksi Fenolik Daun Legetan Warak (<i>Adenostemma Lavenia</i> (L.) Kuntze) Berbantu Gelombang Mikro", <i>Jurnal Farmasi Indonesia</i> , 2019 Publication	1%
6	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%

8	eprints.unsri.ac.id Internet Source	1 %
9	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal-stikmuh-ptk.id Internet Source	1 %
11	jurnal.upmk.ac.id Internet Source	1 %
12	pur-plso.unsri.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.maranatha.edu Internet Source	1 %
14	Brando Melkianus, Fatimawali Fatimawali, Sri Sudewi. "UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (<i>Garcinia mangostana</i> L.) TERHADAP BAKTERI <i>Klebsiella pneumoniae</i> ", PHARMACON, 2019 Publication	1 %
15	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	1 %
16	www.yumpu.com Internet Source	1 %
17	archive.org Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On