

Keragaman dan kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya: Kajian *in silico*

by Dindin Hidayatul Mursyidin

Submission date: 30-Jun-2023 10:04PM (UTC+0800)

Submission ID: 2124770305

File name: 17-Keragaman_Genetik_Garcinia-Mursyidin_Maulana.pdf (1.23M)

Word count: 11243

Character count: 68934

KERAGAMAN DAN KEKERABATAN GENETIK *GARCINIA* BERDASARKAN KANDUNGAN SENYAWA BIOAKTIF DAN AKTIVITAS BIOLOGISNYA: KAJIAN IN *SILICO*

[Genetic Diversity and Relationship of *Garcinia* Based on Bioactive Compounds and Their Biological Activities: *In Silico* Study]

4

Dindin Hidayatul Mursyidin *✉, dan Fajar Nurrahman Maulana

3

Laboratorium Genetika dan Biologi Molekuler, FMIPA Universitas Lambung Mangkurat
Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
email : dindinhm@gmail.com

1

ABSTRACT

Garcinia, belongs to the Clusiaceae family, is a very prospective plant for development. Because of apomixis, however, this plant has a narrow genetic diversity. This study aims to determine the genetic diversity and relationships of *Garcinia* based on the content of bioactive compounds and its biological activities, using *in silico* approach. A total of 64 *Garcinia* species were analyzed by a multivariate method using the MVSP ver. 3.1 software. The results showed that based on these characters, *Garcinia* had a low (narrow) genetic diversity, with a Shannon index of 0.28. However, the xanthone, antifungal activity, and leaf organ are the three of *Garcinia* characters with a high (wide) genetic diversity. The PCA revealed that these characters are contributed positively to this genetic diversity. The UPGMA analysis also revealed that this gemplasm is divide into six main clusters, where the fifth is the largest (53 species). The farthest relationship is shown by *G. hanburyi* and *G. cylindrocarpa*, as well as *G. bancana* and *G. excavata*, at a coefficient of 0.54. In this case, *G. mangostana*, the most popular species of *Garcinia*, has the closest relationship with *G. wightii* at a coefficient of 0.87, and farthest to *G. cylindrocarpa*. This information might be valuable in supporting the preservation and breeding programs of *Garcinia* in Indonesia, particularly for parental selection in the development of superior cultivars.

Key words: Bioactive compound, *Garcinia*, Genetic diversity, *In silico*

ABSTRAK

Garcinia merupakan tumbuhan, termasuk familia Clusiaceae, yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Namun karena bersifat apomiksia, tumbuhan ini memiliki keragaman genetik sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya secara *in silico*. Sebanyak 64 spesies *Garcinia* telah dianalisis secara multivariate menggunakan software MVSP ver. 3 untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetiknya berdasarkan karakter tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Garcinia* memiliki rentang keragaman genetik rendah (sempit), dengan rerata indeks Shannon sekitar 0,28, baik berdasarkan kandungan senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan organ yang menghasilkan senyawa bioaktif tersebut. Namun demikian, senyawa xanton, aktivitas antifungi dan organ daun adalah tiga karakter *Garcinia* yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (luas). Hasil analisis PCA, memperlihatkan bahwa ketiga karakter tersebut berkorelasi positif terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Hasil analisis kluster membagi 64 spesies *Garcinia* kedalam enam kluster utama, yang didalamnya kluster kelima adalah kelompok terbesar dengan jumlah anggota sebanyak 53 spesies. Pada penelitian ini, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs *G. excavata*, pada koefisien 0,54. Sementara itu, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Informasi ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian dan pemuliaan *Garcinia* di Indonesia, terutama seleksi tetua untuk perakitan kultivar unggul.

Kata kunci: Keragaman genetik, *Garcinia*, *In silico*, Senyawa bioaktif

PENDAHULUAN

3

Garcinia merupakan tumbuhan, termasuk familia Clusiaceae, yang sangat prospektif untuk dikembangkan (Murthy *et al.*, 2019). Hal ini karena hampir seluruh bagian (organ) tubuhnya, seperti buah, kulit buah, akar, batang, dan daun dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, termasuk obat-obatan (Murthy *et al.*, 2018). Sebagai contoh, buah manggis (*Garcinia mangostana*), ‘Malabar tamarind’ atau *brindle berry* (*G. gummi-gutta*) dan ‘kokum’ (*G. indica*), selain dapat langsung dimakan (*edible fruits*) karena memiliki rasa yang lezat,

mengandung pula sejumlah nutrien, mineral dan vitamin penting, serta serat pangan yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman (Murthy *et al.*, 2019). Disamping itu, kulit buah ketiga spesies tersebut dilaporkan menghasilkan sejumlah senyawa bioaktif dengan aktivitas biologis penting, seperti antioktiker (Fouotsa *et al.*, 2015), antikanker (Murthy *et al.*, 2019), sitotoksik (Sukandar *et al.*, 2018), anti-inflamasi (Chen *et al.*, 2010), dan antioksidan (Aravind *et al.*, 2016), serta antivirus (Yang *et al.*, 2015). Bahkan sejak ribuan tahun lalu, kulit buah

*Kontributor Utama

*Diterima: 20 Mei 2020 - Diperbaiki: 7 September 2020 - Disetujui: 27 Oktober 2020

ketiga tumbuhan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di wilayah Asia, sebagai bahan ramuan dalam pengobatan tradisional (Murthy *et al.*, 2019).

Saat ini, manggis (*G. mangostana*), ‘Malabar tamarind’ (*G. gummi-gutta*) dan ‘kokum’ (*G. indica*) adalah tiga spesies *Garcinia* yang paling populer dan sangat intensif dikembangkan (Murthy *et al.*, 2018). Namun demikian, ketiga spesies tersebut bersifat apomiksis dan agamospermi (perkembangan buah dan bijinya terjadi tanpa melalui fusi gamet), sehingga memiliki keragaman genetik sempit. Disamping itu, ketiganya juga memiliki keterbatasan, diantaranya: (a) kualitas buah yang rendah, (b) karakteristik pohon yang kurang menarik, (c) kurang toleran terhadap kekeringan, serta (d) batang bawahnya mudah terserang hama atau penyakit (Murthy *et al.*, 2018). Menurut Widiastuti *et al.* (2010), eksplorasi dan karakterisasi plasma nutfah adalah dua kegiatan utama yang dapat dilakukan untuk mendukung perluasan genetik (pemuliaan) suatu plasma nutfah. Khusus di Indonesia, tercatat sebanyak 64 spesies *Garcinia* (Uji, 2007), dari sekitar 300 spesies yang ada di dunia (Hemshekhar *et al.*, 2011), yang dapat digunakan dalam program pemuliaan. Berdasarkan jumlah tersebut, 25 spesies *Garcinia* terdapat di Kalimantan, 22 spesies masing-masing di Sumatera dan Sulawesi, adapun sisanya di pulau-pulau lain, seperti Jawa, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua (Uji, 2007).

Acquaah (2012) menambahkan bahwa analisis keragaman dan kekerabatan genetik juga diperlukan untuk mendukung program perluasan genetik (pemuliaan). Menurut Frankham *et al.* (2004), keragaman genetik dapat diukur melalui beberapa pendekatan, seperti variasi morfologis atau kuantitatif, sitologis atau pengaruh kehilangan alel yang terlihat secara langsung, serta variasi biokimia, termasuk variasi pada level molekuler (sekuen DNA). Sementara itu, kekerabatan genetik dapat diduga dengan menggunakan metode analisis kluster. Dalam analisis ini, pengelompokan didasarkan pada similaritas atau kemiripan karakter yang dimiliki masing-masing individu yang diamati. Menurut McIntosh *et al.* (2010), untuk mencerminkan jarak genetik masing-masing individu secara kuantitatif dalam analisis kluster dapat digunakan nilai

Euclidean. Di lain pihak, analisis komponen utama atau *Principal Component Analysis* (PCA) dapat dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar-karakter tumbuhan yang diamati, serta menentukan karakter mana yang berpengaruh terhadap keragaman genetik yang muncul (Granato *et al.*, 2018). Secara singkat, melalui analisis PCA memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi penting yang representatif untuk tujuan pemuliaan, seperti data hubungan antar-karakter (Das *et al.*, 2017).

1 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keragaman dan kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya, secara *in silico*. Menurut Karp *et al.* (1997), kajian tentang keragaman dan kekerabatan genetik sangat diperlukan (penting) untuk mendukung upaya konservasi dan pemuliaan suatu plasma nutfah pada masa mendatang. Dalam program pemuliaan, keragaman genetik merupakan modal dasar untuk memperoleh karakter unggul yang diinginkan (Acquaah, 2012). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian, budidaya dan pemanfaatan *Garcinia* di Indonesia.

3

BAHAN DAN CARA KERJA

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara *in silico*, yaitu dengan mengumpulkan dan mentabulasi berbagai data (pustaka/literatur) tentang ragam spesies *Garcinia* yang terdapat di Indonesia dan kandungan senyawa bioaktif, serta aktivitas biologis yang dimilikinya. Pada penelitian ini, digunakan 64 spesies *Garcinia* sebagai acuan (Uji, 2007) (Tabel 4).

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara multivariate menggunakan pendekatan taksonomi numerik, dengan bantuan software MVSP ver. 3.1 (Kovach, 2007). Keragaman genetik *Garcinia* kemudian ditentukan menggunakan indeks keragaman genetik Shannon-Weaver (H'), dengan persamaan berikut:

$$H' = - \sum pi(\log_2 pi)/\log_2 N$$

dimana, pi adalah perbandingan frekuensi karakter yang diamati, sedangkan N adalah jumlah seluruh karakter yang diamati. Tingkat keragaman genetik ditentukan dengan kriteria, yaitu maksimum ($H = 1,00$), tinggi ($H = 0,76–0,99$), moderat ($H = 0,46–0,75$), dan rendah ($H = 0,01–0,45$) (Rabara *et al.*, 2014). Analisis komponen utama (PCA) dilakukan pula untuk melihat karakter mana yang menjadi penciri atau memberikan kontribusi terhadap keragaman genetik yang muncul (Das *et al.*, 2017). Sementara itu, rekonstruksi kekerabatan genetik *Garcinia* menggunakan analisis kluster dengan metode UPGMA (*unweighted pair group of arithmetic means*). Analisis dilakukan menggunakan software MVSP ver. 3.1 (Kovach, 2007).

HASIL

Keragaman Genetik

Hasil penelusuran literatur, didapatkan 64 spesies *Garcinia* yang memiliki beragam senyawa bioaktif dan aktivitas biologinya (Lampiran 1). Secara umum, senyawa bioaktif yang dimiliki *Garcinia* tergolong senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan beberapa senyawa lainnya (Tabel 1). *Garcinia* memiliki keragaman genetik rendah berdasarkan senyawa bioaktifnya, namun dalam hal ini xanton merupakan senyawa bioaktif yang memiliki keragaman genetik tinggi (0,87). Sementara itu, senyawa-senyawa lainnya memiliki keragaman

genetik rendah, kecuali alkaloid dengan keragaman genetik sedang (0,55) (Tabel 1).

Berdasarkan aktivitas biologis dari senyawa bioaktif yang dihasilkan, *Garcinia* juga menunjukkan keragaman genetik rendah, dengan rerata sebesar 0,30 (Tabel 2). Namun antifungi adalah aktivitas biologis yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (0,78). Sementara itu, dua aktivitas lainnya, yaitu antinyeri dan antiplasmoidal memiliki keragaman genetik sedang, masing-masing sebesar 0,72 dan 0,54 (Tabel 2).

Berdasarkan bagian/organ tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif, *Garcinia* juga menunjukkan keragaman genetik rendah. Namun daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki keragaman tinggi, dengan nilai 0,79 (Tabel 3). Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa biji memiliki keragaman sedang (0,50), adapun bagian kulit buah yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif memiliki keragaman genetik rendah (0,22).

Hasil analisis PCA (Tabel 4) memperlihatkan bahwa senyawa asam lemak dan steroid berkontribusi paling tinggi terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Sementara itu, kontribusi paling tinggi berdasarkan aktivitas biologis dan organ tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif diperlihatkan oleh aktivitas antinyeri, antioksidan dan antiplasmoidal, serta organ batang (Tabel 4).

Tabel 1. Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan senyawa bioaktif (*Genetic diversity of Garcinia based on bioactive compounds*)

No.	Senyawa Bioaktif (<i>Bioactive Compound</i>)	H indeks (<i>H index</i>)
1.	Alkaloid	0,55**
2.	Antosianin	0,12*
3.	Asam lemak	0,16*
4.	Asam organik	0,22*
5.	Benzofenon	0,11*
6.	Fenol	0,14*
7.	Flavonoid	0,19*
8.	Glikosida	0,22*
9.	Kalkon	0,19*
10.	Saponin	0,27*
11.	Steroid	0,24*
12.	Terpenoid	0,27*
13.	Xanton	0,87***
	Rerata	0,27*

Ket. ***tinggi; **sedang; *rendah.
[Note. ***high; **moderate; *low]

Tabel 2. Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan aktivitas biologis senyawa bioaktif yang dihasilkan
(*Genetic diversity of Garcinia based on biological activity of bioactive compounds produced*)

No.	Aktivitas Biologis (<i>Biological Activity</i>)	H indeks (<i>H index</i>)
1.	Antibakteri	0,12*
2.	Antifungi	0,78***
3.	Antiimmunodulator	0,13*
4.	Antiinflamasi	0,22*
5.	Antikanker	0,12*
6.	Antileukimia	0,22*
7.	Antimalaria	0,22*
8.	Antinyeri	0,72**
9.	Antioksidan	0,15*
10.	Antiplasmodial	0,54**
11.	Antiplatelet	0,19*
12.	Antivirus	0,27*
13.	Hipoglikemik	0,22*
14.	Sitotoksik	0,27*
Rerata		0,30*

Ket. ***tinggi; **sedang; *rendah.
[Note. ***high; **moderate; *low]

Tabel 3. Keragaman genetik *Garcinia* berdasarkan bagian/orgaan tumbuhan yang menghasilkan senyawa bioaktif (*Genetic diversity of Garcinia based on parts/organs of plants producing bioactive compounds*)

No.	Bagian/Organ Tumbuhan (<i>parts/organs of plants</i>)	H indeks (<i>H index</i>)
1.	Akar	0,25*
2.	Batang	0,12*
3.	Biji	0,50**
4.	Buah	0,10*
5.	Cabang/Ranting	0,12*
6.	Daun	0,79***
7.	Getah	0,19*
8.	Kulit Akar	0,13*
9.	Kulit Batang	0,19*
10.	Kulit Buah	0,22*
Rerata		0,26*

Ket. ***tinggi; **sedang; *rendah.
[Note. ***high; **moderate; *low].

Kekerabatan Genetik


Hasil analisis kluster (Gambar 1) menunjukkan bahwa 64 spesies *Garcinia* mengelompok kedalam enam kluster utama, pada koefisien similaritas 0,79. Kluster I dan IV, masing-masing terdiri atas satu spesies, yaitu *G. beccari* dan *G. gummi-gutta*. Sementara itu, kluster II dan III, terdiri atas masing-masing dua spesies (*G. cylindrocarpa* dan *G. balica*; *G. nigrolineata* dan *G. bancana*). Kluster kelima

adalah kelompok terbesar dengan jumlah *Garcinia* sebanyak 53 spesies (Tabel 5). Berdasarkan Gambar 1 diketahui pula bahwa kekerabatan terdekat ditunjukkan oleh tujuh pasang spesies *Garcinia*, meliputi *G. nitida* vs. *G. densivenia*, *G. rigida* vs. *G. urophylla*, *G. urophylla* vs. *G. penangiana*, *G. speciosa* vs. *G. maingayi*, *G. minahassensis* vs. *G. semsepii*, *G. porrecta* vs. *G. vilersiana*, dan *G. wickmannii* vs. *G. penangiana*, dengan koefisien

Tabel 4. Skor PCA karakter senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan bagian/organs *Garcinia* yang menghasilkan senyawa bioaktif (*PCA score of bioactive compounds, biological activities, and parts/organs of Garcinia producing bioactive compounds*)

Karakter (Characters)	Komponen Utama Ke- (Principal Components)				
	1	2	3	4	5
Senyawa bioaktif					
Alkaloid**	0,050	0,142 ^a	0,097	0,028	0,250 ^a
Antosianin/anthocyanin**	0,041	0,070	0,214 ^a	0,025	0,176 ^a
Asam lemak/fatty acid****	0,067	0,220 ^a	0,244 ^a	0,149 ^a	-0,246 ^a
Asam organik/organic acid***	-0,213 ^a	0,071	0,115 ^a	-0,312 ^a	0,034
Benzofenon/benzophenone*	-0,257 ^a	-0,022	0,010	0,013	0,000
Fenol/phenol***	-0,031	0,071	0,102 ^a	-0,156 ^a	0,390 ^a
Flavonoid***	-0,078	0,017	0,159 ^a	-0,292 ^a	-0,138 ^a
Glukosida/glycoside***	-0,095	0,103 ^a	0,139 ^a	-0,333 ^a	-0,007
Kalkon/chalcone	0,022	-0,068	0,090	-0,084	-0,073
Saponin*	-0,069	0,053	0,120 ^a	-0,030	-0,303 ^a
Steroid****	0,022	0,134 ^a	0,204 ^a	0,111 ^a	-0,193 ^a
Terpenoid	0,012	-0,010	-0,050	-0,020	0,059
Xanton/xanthone ***	0,058	0,144 ^a	0,151 ^a	0,261 ^a	0,008
Aktivitas Biologis					
Antibakteri/antibacterial*	-0,025	0,003	0,035	0,021	-0,267 ^a
Antifungi***	-0,147 ^a	0,176 ^a	0,116 ^a	0,010	-0,001
Antiimunomodulator/ antimmuninmodulatory***	-0,343 ^a	0,038	0,099	-0,128 ^a	-0,137 ^a
Antiinflamasiv/ antiinflammatory***	-0,361 ^a	-0,059	-0,014	0,193 ^a	0,119 ^a
Antikanker/anticancer*	-0,312 ^a	0,006	0,024	-0,077	0,037
Antileukimia***	-0,361 ^a	-0,059	-0,014	0,193 ^a	0,119 ^a
Antimalaria/antimalarial***	-0,361 ^a	-0,059	-0,014	0,193 ^a	0,119 ^a
Antinyeri/antianalgesic***	0,024	0,197 ^a	0,294 ^a	-0,150 ^a	0,152 ^a
Antoksidan/antioxidant****	-0,273 ^a	0,052	0,107 ^a	-0,172 ^a	-0,203 ^a
Antiplasmodial***	0,129 ^a	0,035	0,183 ^a	0,136 ^a	0,266 ^a
Antiplatelet***	0,046	-0,356 ^a	0,262 ^a	-0,085	-0,001
Antivirus**	-0,292 ^a	-0,059	-0,021	0,200 ^a	0,049
Hipoglikemik/hypoglycemic**	0,052	-0,396 ^a	0,270 ^a	0,002	0,002
Sitotoksik/cytotoxic**	0,043	-0,402 ^a	0,278 ^a	0,010	0,002
Organ Tumbuhan					
Akar/radix**	-0,094	-0,005	0,289 ^a	0,258 ^a	0,067
Batang/trunk****	0,039	0,231 ^a	0,303 ^a	0,213 ^a	-0,180 ^a
Biji/seed*	0,054	0,187 ^a	0,115 ^a	-0,077	0,046
Buah/fruit**	-0,058	0,031	-0,056	0,193 ^a	0,137 ^a
Cabang/Ranting/branch/ twig ***	0,050	0,163 ^a	0,173 ^a	0,155 ^a	-0,040
Daun/leaf***	-0,112 ^a	0,109 ^a	0,090	-0,201 ^a	0,082
Getah/latex ***	0,053	0,031	-0,052	-0,016	0,036
Kulit Akar/root file***	0,055	0,099	0,103 ^a	-0,257 ^a	0,188 ^a
Kulit Batang/bark skin**	0,040	0,082	0,110 ^a	0,005	0,398 ^a
Kulit Buah/fruit peel***	0,040	0,129 ^a	0,138 ^a	0,175 ^a	-0,054
Nilai Eigen/Eigenvalue	5,707	3,595	3,151	2,827	2,408
Persentase/percentage	14,899	9,387	8,227	7,380	6,286
Persentase kumulatif/ cumulative percentage	14,899	24,286	32,513	39,893	46,178

Ket. *berkontribusi positif terhadap keragaman genetik: *** sangat tinggi; ** tinggi; * sedang; * rendah.
[Note. *contributed positively to genetic diversity: *** very high; ** high; * moderate; * low].



Gambar 1. Dendrogram kekerabatan genetik *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya.
 (Dendrogram of *Garcinia* relationships based on the content of bioactive compounds and their biological activity.)

similaritas masing-masing sebesar 0,99 (99%). Sementara itu, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54 (54%). Pada penelitian ini, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60.

PEMBAHASAN

Informasi tentang keragaman dan kekerabatan genetik sangat diperlukan untuk mendukung upaya konservasi dan pemuliaan suatu plasma nutrifah pada masa mendatang, terutama seleksi tetua dalam perakitan kultivar unggul (Acquaah, 2012; Karp *et al.*, 1997). Pada penelitian ini, *Garcinia* memiliki keragaman genetik rendah, berdasarkan kandungan bioaktif dan aktivitas biologisnya, ditunjukkan oleh rerata nilai indeks Shannon sebesar 0,28 (Tabel 1-3). Namun demikian, beberapa karakter yang

Tabel 5. Pengelompokan *Garcinia* berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya
(*Clustering of Garcinia based on the content of bioactive compounds and their biological activities*)

No	Nama Spesies (Name of Species)	Kluster (Cluster)	No	Nama Spesies (Name of Species)	Kluster (Cluster)
1.	<i>G. beccari</i>	I	33.	<i>G. forbesii</i>	V
2.	<i>G. cylindrocarpa</i>	II	34.	<i>G. vieillardii</i>	V
3.	<i>G. balica</i>	II	35.	<i>G. viltersiana</i>	V
4.	<i>G. nigrolineata</i>	III	36.	<i>G. solomonensis</i>	V
5.	<i>G. bancana</i>	III	37.	<i>G. porrecta</i>	V
6.	<i>G. gummi-gutta</i>	IV	38.	<i>G. nitida</i>	V
7.	<i>G. microphylla</i>	V	39.	<i>G. densivenia</i>	V
8.	<i>G. mangostana</i> *	V	40.	<i>G. prainiana</i>	V
9.	<i>G. fusiformis</i>	V	41.	<i>G. speciosa</i>	V
10.	<i>G. excavata</i>	V	42.	<i>G. maingayi</i>	V
11.	<i>G. parvifolia</i>	V	43.	<i>G. cornea</i>	V
12.	<i>G. hombroniana</i>	V	44.	<i>G. prussii</i>	V
13.	<i>G. hanburyi</i>	V	45.	<i>G. wickmannii</i>	V
14.	<i>G. gaudichaudii</i>	V	46.	<i>G. urophylla</i>	V
15.	<i>G. griffithii</i>	V	47.	<i>G. rigida</i>	V
16.	<i>G. celebica</i>	V	48.	<i>G. penangiana</i>	V
17.	<i>G. morella</i>	V	49.	<i>G. paucinervis</i>	V
18.	<i>G. mannii</i>	V	50.	<i>G. microcarpa</i>	V
19.	<i>G. tetranda</i>	V	51.	<i>G. merguensis</i>	V
20.	<i>G. minutiflora</i>	V	52.	<i>G. semseii</i>	V
21.	<i>G. smethmannii</i>	V	53.	<i>G. minahassensis</i>	V
22.	<i>G. dulcis</i>	V	54.	<i>G. picrorhiza</i>	V
23.	<i>G. wightii</i>	V	55.	<i>G. miquelianii</i>	V
24.	<i>G. nervosa</i>	V	56.	<i>G. macrophylla</i>	V
25.	<i>G. daedalanthera</i>	V	57.	<i>G. dives</i>	V
26.	<i>G. spicata</i>	V	58.	<i>G. tetalalata</i>	V
27.	<i>G. candidulata</i>	V	59.	<i>G. livingstonei</i>	V
28.	<i>G. scortechinii</i>	V	60.	<i>G. brevirostris</i>	V
29.	<i>G. malaccensis</i>	V	61.	<i>G. subelliptica</i>	VI
30.	<i>G. goudotiana</i>	V	62.	<i>G. schomburgkiana</i>	VI
31.	<i>G. xipshuanbannaensis</i>	V	63.	<i>G. xanthochymus</i>	VI
32.	<i>G. riedeliana</i>	V	64.	<i>G. atroviridis</i>	VI

Ket.*spesies paling populer dalam genus *Garcinia* [Note. * the most popular in genus *Garcinia*]

diamati memiliki keragaman genetik tinggi, seperti keberadaan senyawa xanton (Tabel 1), aktivitas antifungi (Tabel 2) dan organ daun (Tabel 3).

Menurut Murthy *et al.* (2019), xanton merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan polifenol dan secara struktur terdiri atas cincin aromatik trisiklik. Senyawa ini diklasifikasikan menjadi lima kelompok utama, yaitu xanton beroksigen sederhana, glikosida xanton, xanton terprenilasi, xantonolignoid, dan xanton dengan struktur lain (Ruan *et al.*, 2017). Senyawa xanton dan turunannya ditemukan pada sebagian besar *Garcinia*, termasuk tiga spesies paling populer, yaitu manggis (*G. mangostana*), *brindle berry* (*G. gummi-gutta*), dan 'kokum' (*G. indica*) (Ruan *et al.*, 2017). Pada buah manggis, xanton ditemukan dalam bentuk gugus isoprena, fenolik, dan metoksi yang tersubstitusi. Sampai saat ini, lebih dari 54 turunan xanton telah dilaporkan terdapat pada buah manggis (Murthy *et al.*, 2018). Pada *brindle berry*, juga terdapat xanton dengan struktur polisoprenilasi, yaitu oxy-guttiferone I, oxy-guttiferone K, oxy-guttiferone K2, dan oxy-guttiferone M (Murthy *et al.*, 2018).

Senyawa α , β dan γ -mangostin pada manggis adalah senyawa turunan xanton yang dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, seperti antioksidan, antiinflamasi, antikanker, dan antimikroba (Murthy *et al.*, 2018), termasuk antifungi (Rahmayanti *et al.*, 2016; Sholihah *et al.*, 2015). Khusus untuk aktivitas antifungi, ekstrak *G. mangostana* mampu menghambat *Candida albicans* (Rahmayanti *et al.*, 2016) dan *Trichophyton mentagrophytes* (penyebab dermatomycosis) (Sholihah *et al.*, 2015). Aktivitas antifungi juga dilaporkan pada ekstrak *G. artoviridis* dan mampu menghambat fungi *Cladosporium herbarium* (Mackeen *et al.*, 2002).

Xanton dan beragam senyawa metabolit sekunder lainnya pada penelitian ini ditemukan pada organ daun beberapa spesies *Garcinia*, termasuk *G. mangostana* dan *G. gummi-gutta* (Lampiran). Senyawa metabolit sekunder secara umum disekresikan dan disimpan dalam vakuola atau lateks pada daun. Berapa turunan daun seperti trikoma, epidermis, dinding sel juga terkadang menjadi lokasi penimbunan senyawa

metabolit sekunder. Secara biokimiawi, beberapa senyawa metabolit sekunder memiliki jalur biosintesis yang kompleks. Sebagai contoh, senyawa xanton secara biogenik diduga berasal turunan senyawa antara benzofenon melalui jalur campuran sikimat dan asetat (Anantachoke *et al.*, 2012). Mazimba *et al.* (2013), menyebutkan bahwa senyawa antara benzofenon yang dimaksud adalah 2,3'-dihidroksibenzenfonon bercincin. Karbon 1-4 yang terdapat pada senyawa tersebut berperan menyusun cincin A yang diturunkan dari asetat, sedangkan karbon 5-8 terhadap cincin turunan sikimat B (Mazimba *et al.*, 2013).

Dalam biosintesis xanton, sintesis senyawa 2,3',4,6-tetrahidroksibenzenfonon (THPA) juga sangat berperan. Pada proses ini, benzofenon mengalami siklisis intramolekul region-selektif melalui tahap oksidasi satu elektron untuk membentuk xanton yang paling sederhana. Jalur biosintesis xanton pada tumbuhan tingkat tinggi diduga melibatkan kondensasi turunan asam sikimat dan malonil-KoA sebagai unit-unit pemanjangannya. Enzim yang diduga terlibat dalam proses tersebut adalah benzofenon sintase, yang termasuk kedalam famili sintase poliketida tipe III (PKS). Enzim ini menghasilkan beragam senyawa metabolit sekunder dengan memanfaatkan variasi substrat sebagai pemicunya (*starter*), jumlah reaksi kondensasi dan reaksi siklisis untuk menghasilkan *scaffold*, seperti kalkon, piron, kromon, dan stilben (Mazimba *et al.*, 2013).

Pada tumbuhan tingkat tinggi, biosintesis xanton meliputi dua tahap utama. Tahap pertama adalah siklisis senyawa 2,3',4,6-tetrahidroksibenzenfonon (THPA) secara regio-selektif atau melalui kontrol orientasional, maksudnya pembentukan satu isomer konstitusional sebagai produk utama di mana dua atau lebih isomer konstitusional dapat diperoleh. Sebagai contoh pada *G. mangostana*, siklisis yang terjadi pada posisi *para* menghasilkan 1,3,7-trihidroksixanton. Tahap kedua (terakhir) adalah hidrosilasi, sehingga terbentuk senyawa 1,3,6,7-tetrahidroksixanton. Pada tahap ini, xanton sintase sangat diperlukan dan merupakan sitokrom P_{450} oksidase yang memerlukan NADPH dan O_2 . Mekanisme reaksi siklisis mengikuti reaksi

penggandengan fenol oksidatif yang sangat disukai oleh adanya gugus 3'-hidroksil pada posisi *ortho*-*para* (Mazimba *et al.*, 2013).

Berdasarkan analisis kluster (UPGMA), diketahui bahwa *Garcinia* memiliki kekerabatan genetik yang kompleks. Hal ini ditunjukkan oleh kekerabatan genetik terdekat oleh tujuh pasang spesies *Garcinia*, meliputi *G. nitida* vs. *G. densivenia*, *G. rigida* vs. *G. urophylla*, *G. urophylla* vs. *G. penangiana*, *G. speciosa* vs. *G. maingayi*, *G. minahassensis* vs. *G. semseii*, *G. porrecta* vs. *G. vilersiana*, dan *G. wightmannii* vs. *G. penangiana*, dengan koefisien similaritas masing-masing sebesar 0,99. Kompleksitas kekerabatan *Garcinia* diperlihatkan pula oleh kekerabatan terjauh *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54 (54%).

Dalam pemuliaan tanaman, kekerabatan genetik terjauh antar tetua sangat dipertimbangkan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki keragaman genetik tinggi atau luas. Sebaliknya, persilangan tetua yang memiliki kekerabatan genetik dekat cenderung dihindari, karena dapat menghasilkan keturunan dengan keragaman genetik rendah atau sempit, dalam genetika dikenal dengan istilah *inbreeding* (Acquaah, 2012).

Garcinia mangostana pada penelitian ini merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Uji (2007) melaporkan bahwa *G. cylindrocarpa* adalah spesies endemik kepulauan Maluku. Menurut Nazre (2014), berdasarkan karakteristik bunga jantan (terutama warna kelopak, keberadaan dan bentuk pistil), bentuk buah, warna daun, serta pola garis pada glandular, *G. mangostana* paling mirip dengan *G. malaccensis*. Hasil ini dipertegas oleh penelitian Sobir *et al.* (2009) dengan menggunakan penanda isozim dan AFLP.

Berdasarkan penanda isozim, Sinaga *et al.* (2010) melaporkan kedekatan hubungan kekerabatan antara *G. mangostana*, *G. malaccensis*, dan *G. hombroniana*. Bahkan spesies terakhir (*G. hombroniana*) diduga sebagai nenek moyang (progenitor) *G. mangostana* (Sobir *et al.*, 2009).

Menggunakan penanda ISSR, Sobir *et al.* (2011) melaporkan dugaan *G. malaccensis* sebagai turunan allopoliploid dari *G. mangostana*. Hasil penelitian Sulassih *et al.* (2013) juga mengungkapkan pengelompokan ketiga spesies ini berdasarkan penanda morfologis dan ISSR, serta menduga bahwa *G. malaccensis* dan *G. celebia* adalah nenek moyang *G. mangostana*. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abdullah *et al.* (2012) dengan menggunakan penanda ITS, *trnL* dan *accD-psaL*.

Hasil rekonstruksi kekerabatan genetik menggunakan penanda molekuler ITS (*internal transcribed spacer*), *G. mangostana* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. penangiana* (Nazre, 2014; Nazre *et al.*, 2007). Menggunakan penanda yang sama (ITS), Parthasarathy *et al.* (2016) melaporkan kedekatan antara *G. mangostana* *G. xanthochymus*. Hal ini berkorelasi pula secara morfologis karena keduanya memiliki bentuk kanopi dan daun yang sama (Parthasarathy *et al.*, 2016). Adapun Liu *et al.* (2016), melaporkan kedekatan *G. mangostana* dengan *G. intermedia*, juga dengan penanda ITS.

KESIMPULAN

Berdasarkan kandungan senyawa bioaktif, aktivitas biologis dan organ yang menghasilkan senyawa bioaktif, *Garcinia* memiliki rentang keragaman genetik rendah (sempit), dengan rerata indeks Shannon sekitar 0,28. Namun senyawa xanton, aktivitas antifungi dan organ daun adalah tiga karakter *Garcinia* yang menunjukkan keragaman genetik tinggi (luas). Hasil analisis PCA, memperlihatkan bahwa ketiga karakter tersebut berkontribusi positif terhadap keragaman genetik *Garcinia* yang muncul. Hasil analisis kluster membagi 64 spesies *Garcinia* kedalam enam kluster utama, yang didalamnya kluster kelima adalah kelompok terbesar dengan jumlah anggota sebanyak 53 spesies. Pada penelitian ini, kekerabatan terjauh ditunjukkan oleh dua pasang spesies *Garcinia*, yaitu *G. hanburyi* vs. *G. cylindrocarpa* dan *G. bancana* vs. *G. excavata*, pada koefisien 0,54. Sementara itu, *G. mangostana* yang merupakan spesies paling populer dalam genus *Garcinia* memiliki kekerabatan terdekat dengan *G. wightii* pada koefisien 0,87 dan

kekerabatan terjauh dengan *G. cylindrocarpa* pada koefisien 0,60. Informasi ini diharapkan memiliki manfaat yang besar untuk mendukung program pelestarian dan pemuliaan *Garcinia* di Indonesia, terutama seleksi tetua untuk perakitan kultivar unggul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Kelompok Studi "Genetika dan Biologi Molekuler", Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat atas waktu luangnya untuk berdiskusi mengenai topik penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N.A.P., Richards, A.J. and Wolff, K., 2012. Molecular evidence in identifying parents of *Garcinia mangostana* L. *Pertanika Journal Tropical Agriculture Science*, 35, pp. 257–270.
- Acuna, U.M., Dastmalchi, K., Basile, M.J. and Kennelly, E. J., 2012. Quantitative highperformance liquid chromatography photo-diode array (HPLC-PDA) analysis of benzophenones and biflavonoids in eight *Garcinia* species. *Journal of Food Composition and Analysis*, 25(2), pp. 215–220.
- Acquaah, G., 2012. *Principles of Plant Genetics and Breeding*: Second Edition, John Wiley and Sons.
- Alen, Y., Safitri, N., Ali, A.M., Ladis, N.H. and Sargent, M.V., 2008. Rubrakhantone dari *Garcinia forbesii* King. dan Bioaktivitasnya. *Jurnal Riset Kimia*, 1, pp. 192–201.
- Ambarwati, N.S.S., 2018. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Penghambat Pertumbuhan Mikroba dari Tanaman *Garcinia latissima* Miq. *Jurnal Farmasi*, 1(1), pp. 1–8.
- Anantachoke, N., Tuchinda, P., Kuhakarn, C., Pohmakotr, M. and Reutrakul, V., 2012. Prenylated caged xanthones: Chemistry and biology. *Pharmaceutical Biology*, 50, pp. 78–91.
- Aravind, A.P., Asha, K.R.T. and Rameshkumar, K.B., 2016. Phytochemical analysis and antioxidant potential of the leaf of *Garcinia travancorica* Bedd. *Natural Product Research*, 30(2), pp. 232–236.
- Arumugam, A.M.A.L., 2017. Secondary Metabolites from Stem Bark of *Garcinia beccarii* Pierre and *Garcinia cuneifolia* Pierre. Thesis. Universiti Putra Malaysia. pp. 1–29.
- Arwa, P.S., Zeraik, M.L., Ximenes, V.F., da Fonseca, L.M., da Bolzani, S.V. and Silva, D.H.S., 2015. Redox-active biflavonoids from *Garcinia brasiliensis* as inhibitors of neutrophil oxidative burst and human erythrocyte membrane damage. *Journal of Ethnopharmacology*, 174 (1), pp. 410–418.
- Chang, S.C., Chyu, C.F., Chang, I.S., Chiu, H.L. and Kuo, Y.H., 2016. A novel polyprenylated phloroglucinol, garcinialone, from the roots of *Garcinia multiflora*. *Tetrahedron Letter*, 49(36), pp. 5276–5278.
- Chen, J.J., Ting, C.W., Hwang, T.L. and Chen, I.S., 2010. Benzophenone derivatives from the fruits of *Garcinia multiflora* and their anti-inflammatory activity. *Journal of Natural Product*, 72(2), pp. 253–258.
- Dachriyanus, M., Izati, and R., Fahmi, 2004. Senyawa Antioksidan dari Tumbuhan *Garcinia parvifolia* Miq. *Jurnal Kimia Andalas*, 10(1), pp. 11–14.
- Dahan, Z., Hanum, L. and Zahar, E., 2009. Eksplorasi keragaman *Garcinia* L. berdasarkan sumber bukti makromorfologi dan pemanfaatannya bagi perkuliahan morfologi tumbuhan. *Jurnal Pendidikan*, 28(2), pp. 164–172.
- Das, S., Das, S.S., Chakraborty, I., Roy, N. and Sarma, D., 2017. Principal Component Analysis in Plant Breeding. *Biomolecules Reports*, 9, pp. 15–18.
- Deng, Y.X., Pan, S.L., Zhao, S.Y., Wu, M.Q., Sun, Z.Q., Chen, X.H., and Shao, Z.Y., 2012. Cytotoxic alkoxylated xanthones from the resin of *Garcinia hanburyi*. *Fitoterapia*, 83(8), pp. 1548–1552.
- Ee, G.C.L., Foo, C.H., Jong, V.Y.M., Ismail, N.H., Sukari, M.A., Yap, Y.T. and Awang, K., 2012. A new xanthone from *Garcinia nitida*. *Natural Product Research*, 26(9), pp. 830–835.
- Elfita, E., Muhamni, M., Latief, M., Darwati, D., Widiyantoro, A., Supriyatna, S., Bahti, H.H., Dachriyanus, D., Cos, P., Maes, L., Foubert, K., Apers, S. and Pieters, L., 2009. Phytochemistry Antiplasmoidal and other constituents from four Indonesian *Garcinia* spp. *Phytochemistry*, 70, pp. 907–912.
- Elsavariaristi, H., 2015. Isolasi Lupeol dari Ekstrak Metanol Ranting *Garcinia balica* Miq. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Erwati, 2012. Uji Aktivitas Antioksidan dan Ekstrak Daun *Garcinia daedalanthera* Pierre dengan Metode DPPH (1,1-Difenil Pilkrilhidrazil) dan Identifikasi Golongan Senyawa Kimia dari Fraksi Paling Aktif. Skripsi. UI, Jakarta.
- Eviati, P. dan Ersam, T., 2014. Isolasi 1-Hidroksi-5,6,8-Trimetoksi-(3',3':2,3)-Dimetilpiranosanton dari Ekstrak Metanol Kulit Batang *Garcinia cylindrocarpa*. *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, 1, pp. 1–6.
- Fouotsa, H., Lannang, A.M., Dzoyem, J.P., Tatsimo, S.J.N., Neumann, B., Elhoff, J.N. and Sewald, N., 2015. Antibacterial and Antioxidant Xanthones and Benzophenone from *Garcinia smethamannii*. *Planta Medica*, 81, pp. 594–599.
- Frankham, R., Ballou, J.D. and Briscoe, D.A., 2004. *A Primer of Conservation Genetics*. Cambridge University Press, New York.
- Granato, D., Santos, J.S., Escher, G.B., Ferreira, B.L. and Maggio, R.M., 2018. Use of principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis (HCA) for multivariate association between bioactive compounds and functional properties in foods: A critical perspective. *Trends of Food Science and Technology*. Accepted manuscript, pp. 1–41.
- Guo, Y.E., Wang, L.L., Li, Z.L., Niu, S.L., Liu, X.Q., Hua, H.M., Chen, H., Chu, J. and Zhang, T.C., 2011. Triterpenes and xanthones from the stem bark of *Garcinia tetratalata*. *Journal of Asian Natural Product Research*, 13(05), pp. 440–443.
- Hamidon, H., Susanti, D., Taher, M., Zakaria, Z.A., 2017. *Garcinia atroviridis* – A review on phytochemicals and pharmacological properties. *Mammara Pharmaceutical Journal*, 21, pp. 38–47.
- Hartati, S., Triyono, I.K. and Handayani, S., 2014. Cytotoxic Isobractatin (Prenylated Xanthone) Epimer Mixture of *Garcinia eugenifolia*. *Indonesian Journal of Chemistry*, 14, pp. 277–282.
- Hay, A.E., Merza, J., Landreau, A., Litaudon, M., Pagniez, F., Le Pape, P. and Richomme, P., 2008. Antileishmanial polyphenols from *Garcinia vieillardii*. *Fitoterapia*, 79(1), pp. 42–46.
- Hemshikher, M., Sunitha, K., Santhosh, K.S., Devaraja, S., Kempraju, K., Vishwanath, B.S., Niranjana, S.R. and Girish, K.S., 2011. An overview on genus *Garcinia* phytochemical and therapeutic aspects. *Journal of Phytochemistry*, 10(1), pp. 325–351.

- Hu, Q., Niu, D., Wang, S., Qin, Y., Yang, Z., Zhao, G., Yang, Z., Gao, X. and Chen, Z., 2014. New flavones from *Garcinia bracteata* and their biological activities. *Chemistry of Natural Compounds*, 50(6), pp. 985–988.
- Ihsany, A.U. dan Ersam, T., 2018. α -Mangostin dari Ekstrak Kayu dan Kulit Akar *Garcinia tetrandra* Pierre. *Acta Kimia Indonesia*, 3(1), pp. 96–103.
- Ismanto, A.W., 2014. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Santon Tensiklasi dari Kulit Akar *Garcinia dulcis*. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Jamila, N., Khairuddean, M., Khan, S.N., Khan, N. and Osman, H., 2014. Phytochemicals from the bark of *Garcinia hombroniana* and their biological activities. *Research of Natural Products*, 8(3), pp. 312–316.
- Jayanti, H.S.D. dan Ersam, T., 2018. Digeranilasi Santon pada Ekstrak Diklorometana Kulit Batang Wadung (*Garcinia tetrandra* Pierre). *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 7(1), pp. 1–4.
- Karo-Karo, T., Juliani, E. and Nurminah, M., 2019. Physicochemical Properties of Gelugur Powder (*Garcinia atroviridis*), in: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing Ltd., pp. 1–4.
- Karp, A., Kresovich, S., Bhat, K. V., Ayad, W.G. and Hodgkin, T., 1997. *Molecular tools in plant genetic resources conservation: A guide in the technologies*. IPGRI technical bulletin.
- Khalid, R.M., Jabit, M.L., Abas, F., Stanslas, J., Shaari, K. and Lajis, N.H., 2007. Cytotoxic xanthones from the leaf of *Garcinia urophylla*. *Natural Products Communication*, 2 (3), pp. 271–276.
- Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S., 2013. Friedolanostanes and xanthones from the twigs of *Garcinia hombroniana*. *Phytochemistry*, 85(1), pp. 161–166.
- Kovach, W.L., 2007. *Multi-variate statistical package for windows*, ver. 3.1. Kovach Computing Services, Wales UK.
- Lailati, M., 2017. Koleksi *Garcinia* spp. dan Potensinya di Kebun Raya Cibodas. *Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Tanaman Lokal untuk Pangan dan Industri*, 1(1), pp. 34–38.
- Lavaud, A., Richomme, P., Gatto, J., Aumond, M.C., Poullain, C., Litaudon, M., Andriantsithaina, R. and Guillet, D., 2015. A tocotrienol series with an oxidative terminal prenyl unit from *Garcinia amplexicaulis*. *Phytochemistry*, 109(1), pp. 103–110.
- Le, D.H., Nishimura, K., Takenaka, Y., Mizushima, Y. and Tanahashi, T., 2016. Polyprenylated benzoylphloroglucinols with DNA polymerase inhibitory activity from the fruits of *Garcinia schomburgkiana*. *Journal of Natural Products*, 79(7), pp. 1798–1807.
- Liu, Z., Ni, Y. and Liu, B.O., 2016. Genetic relationships of several *Garcinia* species (Clusiaceae) revealed by ITS sequence data. *International Education Science Research Journal*, 2, pp. 11–15.
- Mackeen, M.M., Ali, A.M., Lajis, N.H., Kawazu, K., Kikuzaki, H. and Nakatani, N., 2002. Antifungal garcinia acid esters from the fruits of *Garcinia atroviridis*. *Zeitschrift für Naturforsch. - Sect. C Journal Bioscience*, 57, pp. 291–295.
- Mahamodo, S., Rivière, C., Neut, C., Abedini, A., Ranarivelo, H., Duhal, N., Roumy, V., Hennebelle, T., Sahpaz, S., Lemoine, A., Razafimahefo, B., Bailleul, F., Razafimahefo, D. and Andriamihaja, B., 2014. Antimicrobial prenylated benzoylphloroglucinol derivatives and xanthones from the leaf of *Garcinia goudotiana*. *Phytochemistry*, 102(1), pp. 162–168.
- Mahmiah, dan Ersam, T., 2011. Santon Termodifikasi dari *Garcinia cylindrocarpa* Kosterm. Bersifat Aktif Anti-malaria. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Mazimba, O., Nana, F., Kuete, V. and Singh, G.S., 2013. *Xanthones and Anthranoids from the Medicinal Plants of Africa*, in: *Medicinal Plant Research in Africa*. Elsevier Inc., pp. 393–434.
- Mcintosh, A.M., Sharpe, M. and Lawrie, S.M., 2010. *Research methods, statistics and evidence-based practice*, in: *Companion to Psychiatric Studies*. Elsevier Ltd., pp. 157–198.
- Meechai, I., Phupong, W., Chunglok, W. and Meepowpan, P., 2016. Anti-radical activities of xanthones and flavonoids from *Garcinia schomburgkiana*. *International Journal of Pharmaceutical Science*, 8(9), pp. 235–238.
- Meesakul, P., Pansanit, A., Maneerat, W., Sripisut, T., Ritthiwigrom, T., Machana, T., Cheenpracha, S., and Laphookhieo, S., 2016. Xanthones from *Garcinia propinqua* Roots. *Natural Product Communications*, 11 (1), pp. 87–90.
- Messi, B.B., Ndjoko-Isset, K., Hertlein-Amslinger, B., Lannang, A.M., Nkengfack, A.E., Wolfender, J.L., Hostettmann, K. and Bringmann, G., 2012. Preussianone, a new flavanonechromone biflavonoid from *Garcinia preussii*. *Engl. Molecules*, 17(5), pp. 6114–6125.
- Mian, V.J., 2012. *Phytochemical Studies of Garcinia eugenfolia* Wall., *G. nitida* Pierre., *G. mangosiana* L., and *Morinda citrifolia* L. and their Biological Activities. Thesis. Universiti Putra Malaysia.
- Momo, IJ., Kuete, V., Dufat, H., Michel, S. and Wandji, J., 2011. Antimicrobial activity of the methanolic extract and compounds from the stem bark of *Garcinia lucida* Vesque (Clusiaceae). *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science*, 3(11), pp. 215–217.
- Muharni, 2010. Triterpenoid Lupeol dari Manggis Hutan (*Garcinia bancana* Miq.). *Jurnal Penelitian Sains*, 13, pp. 40–45.
- Muharni, Elfita, and Handi, 2011. 3-Oxo Friedelin Compound from the Stem Bark of Manggu Leuweng (*Garcinia cornea*), in: *Proceedings of the International Seminar on Exploring Research Potentials*. Sriwijaya University, Palembang, pp. 265–271.
- Muharni, Supriyatna, Bahti, H.H. and Dachriyanus, 2009. Phenolic Compound from the Stem Bark of Manggis Hutan (*Garcinia bancana* Miq.) and their Antioxidant Activity. *Indonesian Journal of Chemistry*, 9, pp. 321–327.
- Murthy, H.N., Dandin, V.S., Dalawai, D., Park, S.-Y., Paek, K.-Y., 2019. *Bioactive Compounds from Garcinia Fruits of High Economic Value for Food and Health*, in: Merillon, J.M., Ramawat, K.G. (Eds.). *Bioactive Molecules in Food*. Springer Nature Switzerland AG, pp. 1643–1670.
- Murthy, H.N., Dandin, V.S., Dalawai, D., Park, S.-Y. and Paek, K.-Y., 2018. *Breeding of Garcinia spp.*, in: Al-Khayri, J.M. (Ed.), *Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits*. Springer International Publishing AG, pp. 773–809.
- Muthia, R., Saputri, R. dan Verawati, S.A., 2019. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Buah Mundur (*Garcinia forbesii* King.) Menggunakan Metode DPPH (2, 2-Diphenyl-1-Picrylhydrazin). *Jurnal Pharmascience*, 06, pp. 74–82.
- Nazre, M., 2014. New evidence on the origin of mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) based on morphology and ITS sequence. *Genetics Resources of Crop Evolution*, 61, pp. 1147–1158.
- Nazre, M., Clyde, M.M. and Latiff, A., 2007. Phylogenetic relationships of locally cultivated *Garcinia* species with some wild relatives. *Malaysian Applied Biology*, 36, pp. 31–40.
- Nidyasari, R.S., Akmal, H. and Ariyanti, N.S., 2018. Karakterisasi morfologi dan anatomi tanaman manggis dan kerabatnya (*Garcinia* spp.) di Taman Buah Mekarsari. *Jurnal Sumberdaya Hayati*, 4(1), pp. 12–20.

- Nontakham, J., Charoenram, N., Upamai, W., Taweechotipatr, M. and Suksamarn, S., 2014. Anti-Helicobacter pylori xanthones of *Garcinia fusca*. *Archives of Pharmacological Research*, 37(8), pp. 972–977.
- On, S., Aminudin, N., Ahmad, F., Sirat, H.M. and Taher, M., 2016. Chemical constituents from stem bark of *Garcinia prainiana* and their bioactivities. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry Research*, 8(5), pp. 756–760.
- Osorio, E., Londono, J. and Bastida, J., 2013. Low-Density lipoprotein (LDL)-Antioxidant biflavonoids from *Garcinia madruno*. *Molecules*, 18(5), pp. 6092–6100.
- Pandey, R., Chandra, P., Kumar, B., Srivastva, M., Aravind, A.A., Shameer, P.S. and Rameshkumar, K.B., 2015. Simultaneous determination of multi-class bioactive constituents for quality assessment of *Garcinia species* using UHPLC-QoQ LITMS/MS. *Indian Crops Product*, 77(1), pp. 861–872.
- Parthasarathy, U., Nandakishore, O.P., Rosana, O.B., Nirmal Babu, K., Senthil Kumar, R. and Parthasarathy, V.A., 2016. Identification of molecular markers to study the *Garcinia* spp. diversity. *Indian Journal Experimental Biology*, 54, pp. 400–405.
- Pratiwi, P. dan Ersam, T., 2013. Uji Kemurnian Dua Senyawa dari Ekstrak Metanol Kayu Batang *Garcinia cylindrocarpa*. *Jurnal Sains dan Seni POMITS*, 2(2), pp. 2337–3520.
- Purbowati, R. dan Ersam, T., 2017. 2, 4, 6-Trihidroksi Benzofenon dari Kulit Batang *Garcinia balica* Miq. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6, pp. 2337–3520.
- Rabara, R.C., Ferrer, M.C., Diaz, C.L., Newingham, M.C.V. and Romero, G.O., 2014. Phenotypic diversity of farmers' traditional rice varieties in the Philippines. *Agronomy*, 4, pp. 217–241.
- Rahmayanti, F., Suniarti, D.F., Masud, Z.A., Bachtiar, B.M., Winardhani, Y.S. and Subita, G.P., 2016. Ethyl acetate fraction of *Garcinia mangostana* Linn pericarp extract: Anti-*Candida albicans* and epithelial cytotoxicity. *Asian Journal of Pharmacy and Clinical Research*, 9, pp. 335–338.
- Ruan, J., Zheng, C., Liu, Y., Qu, L., Yu, H., Han, L., Zhang, Y. and Wang, T., 2017. Chemical and Biological Research on Herbal Medicines Rich in Xanthones. *Molecules*, 22, pp. 1–19.
- See, I., Ee, G.C.L., Teh, S.S., Kadir, A.A. and Daud, S., 2014. Two new chemical constituents from the stem bark of *Garcinia mangostana*. *Molecules*, 19(6), pp. 7308–7316.
- Sharif, N.W.M., Mustahil, N.A., Noor, H.S.M., Sukari, M.A., Rahmani M., Taufiqiyah, Y.H. and Ee, G.C.L., 2011. Cytotoxic Constituents of *Caladenia excavata*. *African Journal of Biotechnology*, 10(72), pp. 337–341.
- Sholihah, T.P., Martina, A. dan Yuhamer, 2015. Uji Aktivitas Antifungal Kulit Manggis (*Garcinia mangostana*) dan Semangka (*Citrullus vulgaris*) terhadap *Trichophyton mentagrophytes* Penyebab Dermatomykosis. *JOM FMIPA*, 2, pp. 1–10.
- Sinaga, S., Sobir, Poerwanto, R., Aswidinnoor, H. and Duryadi, D., 2010. Genetic Diversity and The Relationship Between The Indonesian Mangosteen (*Garcinia mangostana*) and The Related Species Using Isozyme Markers. *Jurnal Natur Indonesia*, 13, pp. 53–58.
- Siridechakom, I., Phakhodee, W., Rithiwigrom, T., Promgool, T., Deachathai, S., Cheenpracha, S., Prawat, U. and Laphookhieo, S., 2012. Antibacterial dihydrobenzopyran and xanthone derivatives from *Garcinia cowa* stem barks. *Fitoterapia*, 83(8), pp. 1430–1434.
- Sobir, Poerwanto, R., Santosa, E., Sinaga, S. and Mansyah, E., 2011. Genetik variabilitas in apomictic mangosteen (*Garcinia mangostana*) and its close relatives (*Garcinia* spp.) based on ISSR markers. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 12, pp. 59–63.
- Sobir, Sinaga, S., Poerwanto, R., Rismitasari, and Lukman, R., 2009. Comparison Analysis of Genetic Diversity of Indonesian Mangosteens (*Garcinia mangostana* L.) and Related Species by using Isozymes and AFLP Markers. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 10, pp. 163–167.
- Stark, T.D., Losch, S., Salger, M., Balemba, O.B., Wakamatsu, J., Frank, O. and Hofmann, T., 2015. A new NMR approach for structure determination of thermally unstable biflavonones and application to phytochemicals from *Garcinia buchananii*. *Magazine of Resonance Chemistry*, 53(10), pp. 813–820.
- Sukandar, E.R., Kaennakam, S., Rassamee, K., Siripong, P., Fatmawati, S., Ersam, T. and Tip-pyang, S., 2018. Xanthones and biphenyls from the stems of *Garcinia cylindrocarpa* and their cytotoxicity. *Fitoterapia*, 130, pp. 112–117.
- Sulassih, Sobir, and Santosa, E., 2013. Phylogenetic analysis of mangosteen (*Garcinia mangostana* L.) and its relatives based on morphological and inter simple sequence repeat (ISSR) markers. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*, 45, pp. 478–490.
- Taher, M., Susanti, D., Rezali, M.F., Zohri, F.S.A., Ichwan, S.J.A., Alkhamaiseh, S.I. and Ahmad, F., 2012. Apoptosis, antimicrobial and antioxidant activities of phytochemicals from *Garcinia malaccensis* Hk. f. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 5(2), pp. 136–141.
- Tan, W.N., Khairuddin, M., Wong, K.C., Tong, W.Y. and Ibrahim, D., 2016. Antioxidant compounds from the stem bark of *Garcinia atroviridis*. *Journal of Asian Natural Product Research*, 18(8), pp. 804–811.
- Tantapakul, C., Phakhodee, W., Rithiwigrom, T., Cheenpracha, S., Prawat, U., Deachathai, S. and Laphookhieo, S., 2012. Rearranged benzophenones and prenylated xanthones from *Garcinia propinqua* twigs. *Journal of Natural Products*, 75(9), pp. 1660–1664.
- Trisutan, K., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S. and Hutadilok-Towatana, N., 2013. Tetraoxxygenated xanthones and biflavonoids from the twigs of *Garcinia merguensis*. *Phytochemistry Letters*, 6(4), pp. 511–513.
- Uji, T., 2007. Keanekaragaman, Persebaran dan Potensi Jenis-Jenis *Garcinia* di Indonesia. *Berkala Penelitian Hayati*, 12, pp. 129–135.
- Utami, S., 2016. Patentabilitas Antibakteri dari Tanaman *Garcinia*. *Jurnal Teknik Kedokteran Yarsi*, 24(1), pp. 69–79.
- Vo, H.T., Ngo, N.T., Bui, T.Q., Pham, H.D. and Nguyen, L.H.D., 2015. Geranylated tetraoxxygenated xanthones from the pericarp of *Garcinia pedunculata*. *Phytochemistry Letters*, 13(1), pp. 119–122.
- Widiastuti, A., Obir, and Suhartanto, M.R., 2010. Diversity analysis of mangosteen (*Garcinia mangostana*) irradiated by gamma-ray based on morphological and anatomical characteristics. *Nusantara Bioscience*, 2, pp. 23–33.
- Widyowati, R. dan Rahman, A., 2010. Kandungan Kimia dan Aktivitas Antimikroba Ekstrak *Garcinia celebica* L. terhadap *Staphylococcus aureus*, *Shigella dysenteriae* dan *Candida albicans*. *Jurnal Farmasi Airlangga*, 8(2), pp. 23–27.
- Yang, Y., Li, L. and Lou, J., 2015. Isoprenylated flavones from *Garcinia bracteata* and their anti-tobacco mosaic virus activity. *Heterocycles*, 91(2), pp. 375–380.
- Zhao, Y., Liu, J.P., Lu, D., Li, P.Y. and Zhang, L.X., 2012. Two new xanthones from the pericarp of *Garcinia mangostana*. *Natural Products Research*, 26(1), pp. 61–65.

Lampiran 1. Ragam Senyawa Bioaktif dan Aktivitas Biologis yang dihasilkan *Garcinia* (*Diversity of Bioactive Compounds and Biological Activities produced by Garcinia*)

Tabel 6. Ragam senyawa bioaktif dan aktivitas biologis yang dihasilkan *Garcinia* (*Diversity of bioactive compounds and biological activities produced by Garcinia*)

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyawa (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
1	<i>G. atroviridis</i>	23	9	Flavonoid & Asam Organik	Biflafon, Asam sitrat, Asam tartatik, Asam malik, Asam askorlik, Asam pentadekonik, Asam nonadekonik, Asam dodekanoi, & Asam hidroksitrat.	Buah dan Kulit buah		Hamidon <i>et al.</i> (2017); Karo-Karo <i>et al.</i> (2019)
2	<i>G. batifica</i>	8	5	Kuinon	Atroviridin, Benzoquinone, airovirinone, Depsidone & atroviridistone.	Akar	Antibakteri	
3	<i>G. bancana</i>	15	9	Flavonoid, Xanton, As. Organik	Morellolavone, Atroviridisone B, Naringenin, Succinic acid, Garcinol, Camboginol, Isogarcinol, Garcineflavone A, & Garcineflavanol A	Kulit Batang		Purbowati & Ersan (2017); Elsavaristi (2015); Hartati <i>et al.</i> (2014)
			2	As. Organik Kalkon, Flavonoid, As. Organik, & Fenol	5-hidroksi-4-fenilkumarin & 7-hidroksi-4-fenilkumarin 5'-bromo-2'-hidroksi-4'; 6'-trimetoksi chalkon, dulcosiflavan, 5,7-dihidroksi-8-(1,2-dihidroxi-3-metilbutil)-3)-4-fenilkumarin, & 2,4,6-Trihidroksi benzenofenon Triterpenoid & lupeol	Buah Kulit Batang	Antioksidan, Sitosik, Antimikroba, Antifungi, Antimalaria, Antileukimia, Hipoglisemik	Muharni (2010); Muharni <i>et al.</i> (2009)
			1	Terpenoid	Lupeol	Daun	Antioksidan	
			1	Fenol Kalkon	Epikatekin Garcinol Isogarenol (-)-mellein			
			8	Fenol Glikosida Flavonoid Terpenoid Sterol Terpenoid Xanton	8-hydroxy-6-methoxy-3-n-pentylisocoumarin Blumenol C-O-b-D-glucoside Quercetin 3-O-a-L-rhamnoside & Kaempferol 3-O-a-L-rhamnoside Lupeol Stigmastrol Triterpenoid Xanton teroksigenasi, Xanton terprenilasi Benzofenon polisoprenilasi	Ranting dan daun Ranting dan daun Ranting dan daun	Antibakteri Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)	
			5	Benzofenon				Dahlan <i>et al.</i> (2009); Muharni <i>et al.</i> (2011)

Artikel Penelitian

Mursyidin dan Maulana – Keragaman dan Kekerabatan Genetik *Garcinia* Berdasarkan Kandungan Senyawa

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyawa a (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
4	<i>G. beccari</i>	23	11	Xanton & Fenolik	Cowanin, cowanol, cowaxanton, Forbesione, Forbexanton, Alkaloid, Flavonoid, Saponin, Steroid, Tanin, & Fenol	Buah	Antiosididan, sitiotoksik, & Antibakteri	Alen <i>et al.</i> (2008); Dahlan <i>et al.</i> (2009)
5	<i>G. brevirostris</i>	13	6	Xanton	Rubraxanthone, trapezifoli xanthone, alfa-mangostin, beta-mangostin, dulikanthone C, & osajaxanthone	Kulit batang		
6	<i>G. candidata</i>	17	6		Antosianin, Tanin, Rubraxanton, trapezifoli xanton, Alfa mangostin, & Betamangostin	Kulit		
7	<i>G. celebica</i>	12	3	Biflavonoid	Friedelin, Metanon, Tetrahydrodoksi, Triterpenoid, & Inophyllin	Buah	Antikanker & Antibakteri	Hartati <i>et al.</i> (2014); Mian (2012)
			5	Fenol	Asam magniferolik, Benzienol, Euphadienol, Kalosanton, Rubrasanton, Stigmasterol, Mangostin, Isobrakatin	Buah		
			5	Xanton	α -mangostin, β -mangostin, fuscaxanthone A, fuscaxanthone C, 6-O-methylmangostanin, & cowaxanthone D	Buah	Antiinflamasi & Antibakteri	Siridechakorn <i>et al.</i> (2012)
			6	Mangostin	Garcinacowol, garciniacowone, & parvifolol F	Buah		Siridechakorn <i>et al.</i> (2012)
			3	Garcinol,	cowa xanthone & 1,7-dihydroxyxanthone			
				Xanton	norcowanin, cowanin, cowanol, cowagarcinone B, cowagarcinone D, cowagarcinone E, Flavonoid, Biflavonoid, & Terpenoid	Buah		
			2	Flavonoid	Dihidroksisanton & isosanton	Kulit Batang	Antibakteri	Siridechakorn <i>et al.</i> (2012)
				Steroid	Sitosterol, Stigmasterol, Friedelin, Betamangostin, & Tannin	Kulit Batang		
				Terpenoid	Friedelin and GarcilhombroneD	daun	Antiplasmodial	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Elfta <i>et al.</i> (2009)
			3	Flavonoid	Flavonoid, Biflavonoid, & Terpenoid		Antimikroba	
			2	Xanton	Dihidroksisanton & isosanton	Kulit Batang	Antikanker	
			5	Steroid	Sitosterol, Stigmasterol, Friedelin, Betamangostin, & Tannin		Antikanker & Antibakteri	
			2	Terpenoid	Friedelin and GarcilhombroneD		Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)	

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
8	<i>G. cornea</i>	5	2	Xanton	alfa-xanton & beta-xanton	Kulit Batang	Antimikroba & Antikanker	Muharni <i>et al.</i> (2011)
9	<i>G. cylindrocarpa</i>	13	3	Terpenoid, Flavonoid	Triterpenoid, Oxofriedelin, & Biflavonoid		Antiinflamasi	
10	<i>G. daedalanthera</i>	6	10	Fenol	Fenolat, Dimethylpyranon, Piran, Hidroksi, Trimeetoksi, Dihidroksi, Trihidroksi, Tetreameetotoksi, Dihidroksi, & Tetrametil dhidrido puran	Buah 	Antileukimia, Hipoglisemik, Sitosksik, Antimikroba, Antifungi, Anti HIV, & Antioksidan	Mahmiah & Ersan (2011)
11	<i>G. densivenia</i>	3	3	Xanton	1-hidroksi- 5,6,8-trimetoksif(3',3';2,3)-dimetylpiranosanton, dikromensanton, & dimetylpiranosanton	Kulit Batang	Antimalaria	Eviati & Ersan (2014)
12	<i>G. dives</i>	11	2	Alkaloid, Fenol	Alkaloid & lignan	Daun	Antioksidan & Antibakteri	Erawati (2012)
13	<i>G. dulcis</i>	11	1	Flavonoid	Flavonoid, glikosida, terpenoid, & biflavonoid	Kulit Batang	Antiinflamasi	
			11	Xanton	Pyranojacareubin	Kulit Batang	Antibakteri & Antioksidan	Osorio <i>et al.</i> (2013) 
			11	Xanton	Morelloflavone & O-methyl fukugetin			Sukandar <i>et al.</i> (2016) 
			11	Biflavonoid	Cowagarcinone A-E, covanaxanthone, cowanin, covanol, 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,5-bis (3methyl-2-buteny)xanthone, mangostinone, & fucaxanthone A	Cabang	Antibakteri & Antioksidan	
			11	Xanton	Dulcisxanthone A	Daun 	Antibakteri	
			11	Biflavonoid	1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2-(3-methyl-2-butetyl)xanthone	Buah	Antioksidan, Antiinflamasi	Utami (2016)
			7		Amentoflavone, fukigetin, volkensiflavone, and flavanone-(1-3;11-8)-chromone, 1-	Daun 	Antimalaria	Sukandar <i>et al.</i> (2016) 
			11	Biflavonoid	4'-(flavanone-chromone), Dulcisbiflavonoid A, & Morelloflavone	Cabang	Antibakteri	Ismanto (2014)
			11	Biflavonoid	Podocarpusflavone A			
			11	Biflavonoid	Dulcisbiflavonoid A	Buah		

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyawa a (Total Number of Com- pound)	Rincian jumlah senyawa a (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
14	<i>G. excavata</i>	7	7	Mangostin	Clausenarin, Alkaloid carbazole, Clausine-K, Clausenolide-1-methyl, Xantheyletin, Dentatin, & Nordenatin beta-mangostin, cowanin, d-mangostin, cowanol, & isojacareubin Fuscxanthone I, fuscxanthone A, cowaxanthon, fuscxanthone G, & 1,3,5,6tetrahydroxanthone	Buah	Anti-inflamasi, antiplatelet, antiplasmoidal, antimikroba, antinociceptive & anti- immunomodulat or	Sharif <i>et al.</i> (2011)
15	<i>G. fusiformis</i>	10	5	Xanton	beta-mangostin, cowanin, α -mangostin, cowanol, & isojacareubin Fuscxanthone I, fuscxanthone A, cowaxanthon, fuscxanthone G, &	Daun	Anti-inflamasi, antiplatelet, antiplasmoidal, antimikroba	Nontakham <i>et al.</i> (2014)
16	<i>G. Forbesii</i>	2	2	Xanton	Forbexanthone, pyranojacareubin, and 1,3,7-trihydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-xanthone Gaudichaudiones A- H, gaudichaudic acids A-E, morellic acid, & forbesione Gaudichaudic acids (F-I) & Gaudispiro lactone	Cabang	Antimikroba & Antinflamasi	Mian <i>et al.</i> (2010)
17	<i>G. gaudichaudii</i>	20	15	Xanton	Guttiferone I, Isoxanthochymol, & guttiferone I	Daun	Antibakteri	Yang <i>et al.</i> (2015)
			5	Alkaloid		Batang	Antikanker	
			3	Terpenoid		Kulit	Antibakteri & Antiosidan	
			2	Xanton	1,5-Dihydroxy-3,6-dimethoxy-2,7diprenylxanthone and 1,6,1,3,6,7tetrahydroxanthone, 1,7-dihydroxyxanthone, tetrahydroxanthone and 1,3,5,6-tetrahydroxanthone, & Griffipavixanthone 1,3,5,6-Tetrahydroxy-7-(3-methylbut-2-enyl)xanthone and rubraxanthone	Kulit Batang	Antibakteri & Antikanker	Lavaud <i>et al.</i> (2015)
18	<i>G. griffithii</i>	11	6	Xanton	Garcinol, guttiferones K, I, J, M and N, Guttfierone I, guttiferone N, guttiferone J, Cambogin (isogarcinol) and camboginol (garcinol)	Daun	Antibakteri & Antinflamasi	
			2	Terpenoid	Garcinol	Buah	Antiosidan & Antinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)
19	<i>G. gummigutta</i>	21	1		Guttiferone E and isogarcinol Fukigicide, GB-1, and amentoflavone Morellolavone, dihydromorellolavone and isomorellic acid	Daun Batang Kulit batang	Antikanker Antiosidan Antinflamasi	Stark <i>et al.</i> (2015)
			2					
			3	Biflavanoid				

Artikel Penelitian

Mursyidin dan Maulana – **Keragaman dan Kekerabatan Genetik *Garcinia* Berdasarkan Kandungan Senyawa**

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com- pound)	Rincian jumlah senyawa senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
20	<i>G. Goudotiana</i>	7	7	Phloroglucinol s/Fenol	Goudotianone 1, 2, Garciniaalone, Parvifoliols A-G, Oblongifolin C, garcicowin B, & garcicumannin 2alpha-Hydroxy-3beta-O-acetylup-20(29)-en 28-oic acid, 3-O-(4-O-acetyl-al- arabinopyranosyl)oleanic acid, Betulinic acid, Messagenic acid, Gaudichaudic acid, Isogambogenic acid, Dexygaudichaudione A, 7 methoxydesoxymorellin, 2-isoprenylfuranoseine 8,8a-epoxymorellin, acid, Morellic acid (MA), Isogambogenic acid (IGA), Epissogambogenic acid (EIGA), Gambogenic acid (GNA), Gambogenic acid (GA), Epigambogenic acid (EGA), Desoxymorellin, Gambogenic acid, Hanburin, Forbesione, Dihydroisomorellin, Desoxygambogenic, & Dihydroisomorellin 2-a-Acetoxy-3 b-hydroxy-19 b-hydrogen-lup- 20(29)-en-28-oic acid (2-acetoxyalphitolic acid), 2-a-hydroxy-3 b-acetoxy-19 b-Hydrogen-lup-20(29)-en-28-oic acid (3- acetoxyalphitolic acid), Betulinic acid, Betulin, & Stimasterol-3-O-b-D-glucopyranoside Gambojin, Morellin dimethyl acetal, Isomorellin B, Morellic acid, Gambogenic acid,	Buah	Antinflamasi	Le et al., 9 (2016); Mahamodo et al. (2014)
21	<i>G. hanburyi</i>	25	Asam Hidroksi		Getah	Antikanker, Antibakteri		Lailati (2017); Yang et al. (2012); Deng et al. (2012)
21	<i>G. hanburyi</i>	48	Xanton		Ranting daun	Antinflamasi		Hemshekhar et al. (2011)

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
22	<i>G. hombroniana</i>	25	5	Fenol	methoxybenzophenone, 2',3',4',4'-tetrahydroxy-6- 6-methoxybenzophenone, and 2',3',4,6- tetrahydroxybenzophenone	Batang	Antibakteri, Antioksidan	Klaiklay <i>et al.</i> (2013); Jamila <i>et al.</i> (2014)
			5	Flavonoid	3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,3',5,5',7- pentahydroxyflavanone, & 3,3',4',5,5',7- pentahydroxyflavone	Batang	Antinflamasi	Pandey <i>et al.</i> (2015)
			2	Xanton	Cambogic acid and mangostin	Daun		Klaiklay <i>et al.</i> (2013)
			3	Xanton	Garcinhambrones A-D 1,3,6-Trihydroxy-7-methoxy-2,8-(3'-methyl- 2butenyl) xanthan, & 1,3,6,7-Tetrahydroxy xanthone,	Ranting		
			6	Biflavonoid	Volkensiflavanone, volkensiflavone-7- Orihamnopyranoside, 4''-O- methylvolkensiflavanone, volkensiflavone-7- Oglucopyranoside, morelloflavone, 3''-O- methylmorelloflavone, and morelloflavone-7- Oglucopyranoside	Batang	Antibakteri	Jamila <i>et al.</i> (2014)
23	<i>G. livingstonei</i>	13	13	Xanton	1,4,5-Trihydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)- 9Hxanthen-9-one, 1,4,5-Trimetekoxy-3-(3- methylbut-2- enyl)-9H-xanthen-9-one, 3,4-dihydro- 6,11dihydroxy-2,2-dimethyl-pyranol[3,2-c]-xan- -then7(2H)-one, 6,11-dihydroxy-2,2-dimethyl- [3,2-c] xanthen-7(2H)-one, and 6,11-dihydroxy -3-	Buah	Antibakteri & Antioksidan	Lailati (2017); Ambarwati (2018); Mono <i>et al.</i> (2011)
24	<i>G. macrophylla</i>	4	4	Benzophenon	methyl-3-(4-methylpent-3-enyl)- 3H,7Hpyranol[2,3-c]xanthen-7-one, & Garcilivin A-C	Batang	Antibakteri	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Utami (2016)
25	<i>G. maingayi</i>	2	2	Benzophenon	Garbogiol, isogarcinol, xanthochymol, & guttiferone E	Kulit batang	Antibakteri & antiinflamasi	Acuna <i>et al.</i> (2012)
26	<i>G. malaccensis</i>	8	6	Benzophenon	Isoxanthochymol and camboginol	Buah	Antibakteri & antiinflamasi	See <i>et al.</i> (2014)
26	<i>G. malaccensis</i>	8	2	Xanton	Mangaphenone, xanthochymol, garcinol, garcimangosone D, isoxanthochymol, & trimethoxy benzophenony	Kulit batang	Antibakteri	Taher <i>et al.</i> (2012)

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
27	<i>G. mangostana</i>	66	6	Xanton	1,5,8-Trihydroxy-3-methoxy-2-[3-methyl-2butenyl]xanthone, and 1,6-dihydroxy-3-methoxy[3-methyl-2butenyl]xanthone, cambogic acid, mangostin, & gertanin Mangostinone, α , β and γ -mangostins, gartanin, garcinone E, 1,5-dihydroxy-2-(3-methylbut-2enyl)-3-methoxy xanthone, and 1,7-dihydroxy-2-(3methylbut-2enyl)-3-methoxyxanthone, 1,3,7,7-Trihydroxy-2-(3-methyl-2-butetyl)-8-(3hydroxy-3-methylbutyl)-xanthone, 1,3,8-trihydroxy-2-(3-methyl-2-butetyl)-4-(3hydroxy-3-methylbutanoyl)-xanthone, garcinones C and D, gartanin, xanthone I, and γ -mangostin 2,4,6,7-Tetrahydroxyxanthone, 3,4,5,3'tetrahydroxybenzophenone, and 2,4,6,5',5'pentahydroxybenzophenone, Guttiferone A, xanthochymol, and guttiferone E	Daun 5	Antikanker, Antibakteri	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Zhao <i>et al.</i> (2012); Xu <i>et al.</i> (2014)
28	<i>G. manni</i>	10	5	Benzophenon	Guttiferon	Kulit buah	Antioksidan & Antibakteri	Xu <i>et al.</i> (2014); Murphy <i>et al.</i> (2019)
29	<i>G. merguerensis</i>	5	5	Xanton	GB-1a, GB-2a, (+)-morelloflavone, (+)-volkensiflavone, & amentoflavone	Kulit batang	Antioksidan & Antibakteri	Acuna <i>et al.</i> (2012)
30	<i>G. microcarpa</i>	5	5	Xanton	Fukugenin, fukugaside, GB-1a, GB-2a and GB-1a-7'-O- β -D-glucoside, and I-5, II-5, I-7, II-7, I-3', I-4', II-4', heptahydroxy-[I-3,II-8]-flavanonyl flavones	Daun, Benih	Antioksidan & Antibakteri	Trisuwant <i>et al.</i> (2013)
31	<i>G. microphylla</i>	10	4	Xanton	biflavonoids, beta-xanthones, benzophenones, & flavonoids	Kulit batang	Antikanker	Pandey <i>et al.</i> (2015)
			4	Mangostin	Guttiferone, guttiferone G, Biphenyls, acyl phloroglucinols, depsidones & terpenoids	Buah 4	Antimikroba Akar	Aravind <i>et al.</i> (2016)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total of Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
32	<i>G. minahassensis</i>	5	5	Xanton	garcinimultiflorone A, garcinimultiflorone B, 13-hydroxy garcinimultiflorone B, & garcinimultiflorone C	Batang	Antioksidan & Antimikroba	Acuna <i>et al.</i> (2012)
33	<i>G. minutiflora</i>	6	1	Benzophenon	4,6,4'-Trihydroxy-2,3'-dimethoxy-3'phenylbenzophenone	Kulit Batang	Antioksidan, Antibakteri, & Antimalaria	Widyowati & Rahman (2010)
34	<i>G. miquelianii</i>	10	10	Xanton	garcinimultiflorone A, garcinimultiflorone B, 13-hydroxy garcinimultiflorone B, and garcinimultiflorone C	Buah	Antibakteri & Antimikroba	Trisuwant <i>et al.</i> (2013)
35	<i>G. morella</i>	13	1	Xanton	Merguenone, 1,5-dihydroxy-60-methyl-60-(4methyl-3-pentenyl)- pyran(20,30,3,2)-xanthone, subelliptone H, 8-deoxycartaninin, rheodioxanthone A, morusigenin G, 6-deoxycareubin, 1,3,5-trihydroxy-4,8-di(3-methylbut-2-enyl)-xanthone, rheodiachromenoxyxanthone, and 6deoxysisojicareubin	Batang	Antibakteri & Antimikroba	Foutsa <i>et al.</i> (2015)
36	<i>G. nervosa</i>	6	1	Benzophenon	Morellin	Benih	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
37	<i>G. nigrodineata</i>	10	2	Biflavonoid	Cam bogic acid and mangostin	Pericarp Daun	Antiiinflamasi	Aravind <i>et al.</i> (2016)
			4	Biflavonoid	Dihydromorelloflavone, morelloflavone-7'-beta-glucoside, fukugetin, and fukugiside Fukugicide, GB-1, GB-2, GB-1a, and ametonoflavone	Batang Daun	Antibakteri	
			4	Biflavonoid	Heptahydroxy-[1-3, II-5, II-8]-flavonony flavones and I-3, II-3, I-5, II-5, I-7, I-7, I-4', II-4' octahydroxy [I-2', II-2'] biflavone	Daun	Antibakteri, Antioksidan	Arwa <i>et al.</i> (2015)
			2	Biflavonoid	Nervosaxanthone	Kulit batang Daun	Antioksidan, Antiiinflamasi	
			1	Xanton	Nervosin, irigegin, and 7-methyl tectorigenin Nigrolinexanthones J-S, Nigrolinexanthones A-I, 1,3,5-trihydroxy-4-(3-hydroxy-3-methylbutyl)xanthone, 1,3,7-trihydroxy-4-(6-hydroxy-3-methylbutyl)xanthone, 1,3,7-trihydroxy-4-(6-deoxyaclareubin, morusigenin C, 1,5-dihydroxy-6',6' - dimethylpyran(2',3';3,2')xanthone, & tovoxanthone Nigrolinacathiphenyls A & B	Ranting	Antioksidan, Antibakteri, sitiooksik dan antimalaria	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Xu <i>et al.</i> (2016); Muharni <i>et al.</i> (2009)
			3	Flavonoid		Daun		
			8	Xanton				
			2	Biphenyls				

No	Species (species)	Jumlah Senyaw a (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
38	<i>G. nitida</i>	6	6	Xanton	1,6-Dihydroxy-5-methoxy-6,6-dimethylpyranolo[2',3'-2,3]-xanthone; inophyllin B, osajaxanthone, 3-isomangostin,& rubraxanthone	Kulit Batang	Antibakteri & Antioxidsidan	Ee <i>et al.</i> (2012)
39	<i>G. paucinervis</i>	13	4 3 5 1	Xanton	Paucinerves A, B, C, & D Paucinervins H-J Paucinervins E, F, G, H, & I Pauciisoflavone A	Daun Daun Bibit steam	Antibakteri	Hu <i>et al.</i> (2014)
40	<i>G. parvifolia</i>	32	11	Xanton	Parvifolixanthones A-C	Ranting	Antimikroba, Antioxidsidan	Dahlan <i>et al.</i> (2009); Dachriyuanus <i>et al.</i> (2004); Chang (2016)
41	<i>G. penangiana</i>	4	4	Xanton	Parvixanthones A-1, Parvixanthone A and rubraxanthone	Batang	Antinflamasi	Xu <i>et al.</i> (2014)
42	<i>G. picrorhiza</i>	4	4	Xanton	Garcidepsidone A, B, C, & D Parvifolidones A & B Parvifolios A, B, C, D, E, F, & G Parvifolios B, C, D, & E Nigrolineaisoflavone A 4-(1,1-Dimethylprop-2-enyl)-1,3,5-triethylxanthone penangianxanthone, cudadriticuxanthone H, macluraxanthone C, & gerontoxanthone C	Daun Ranting Ranting Daun Daun	Antimikroba Antioxidsidan Anikank er Antibakteri	Meechai <i>et al.</i> (2016)
43	<i>G. porrecta</i>	4	4	Xanton	Garcinopacobenzophenone, guttiferonne F, Doitunggarrenones A & B	Batang	Antibakteri	Tantapaku I <i>et al.</i> (2012)
44	<i>G. prainiana</i>	5	5	Biflavonoid	Porkanthone A & dulkanthone E, F, G Morellolflavone, O-methyl fukugetin, volkenisflavone, cudatriticuxanthone, & 4'' methoxyxamenoiflavone	Kulit batang	Antibakteri	Meesakul <i>et al.</i> (2016)
45	<i>G. prussii</i>	3	3	Biflavonoid	Preussanone, Fukugetin & O-methyl fukugetin	Daun	Antinflamasi	Messi <i>et al.</i> (2012)

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (A Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
46	<i>G. riedeliana</i>	22	19	Xanton	Rubraxanthone, isocowanin, & isocowanol	Ranting	Antibakteri	Meechai <i>et al.</i> (2016) ⁹
47	<i>G. rigida</i>	3	3	Xanton	Scortechinones Q-T, scortechinones U-X, scortechinones A-F, H, I, M, L, and P, Tahyaxanthone, Musaxanthone, & asmaxanthone	Batang	Antiinflamasi & Antibakteri	Meechai <i>et al.</i> (2016); Vo <i>et al.</i> (2012)
			8	Xanton	6-O-Demethyloliverixanthone, schomburgkianones A, B, C, D, E, F, G, & H, fisexanthones A and B, 3isomangostin hydrate, and 1,7-dihydroxyxanthone	Daun	Antibakteri	Vo <i>et al.</i> (2012)
			1		Schomburgyanthone A			Sukandar <i>et al.</i> (2016); Meechai <i>et al.</i> (2016); Le <i>et al.</i> (2016); Le <i>et al.</i> (2016)
48	<i>G. schomburgkiana</i>	34	4	Biflavonoid	Euxanthone and gentisin	Batang	Antibakteri	
			2	Despidones	Schomburgepsidones A & B	Buah	Antiinflamasi	
			4	Biphenyls	Schomburgbiphenyl, Aucuparin, nigrolineabiphenyl B and Garcibiphenyl C.	Akar	Antiodksidan	Sukandar <i>et al.</i> (2016)
			3	Phloroglucinols	Oblongfolin C, garcicowin B, and garciyunnanin	Kulit batang		Mungnee <i>et al.</i> (2013)
			3	Flavonoid	Kaempferol, dihydrokaempferol and (-)-5,7,3',5'-tetrahydroxyflavanone	Buah	Antikanker	Le <i>et al.</i> (2013)
			2	Benzophenon	Scortechinones (A and B)	Kulit pohon	Antiodksidan	Sukandar <i>et al.</i> (2016)
					Scortechinones (A, B, D, F, I and D), 400,500-dihydro-1,5-dihydroxy-60,60-dimethylpyrano (20,30:6,7)-400,400,500-trimethylfurano (200,300:3,4)-xanthone, Scortechinones (L, M, N, O and P)	Getah	Antibakteri & antiinflamasi	
49	<i>G. scortechinii</i>	27	15	Xanton	Scortechinones (Q-T), Scortechinones (U-X), Scortechinones (A and B)	Kulit batang	Antibakteri	Hemshekhar <i>et al.</i> (2011)
			10	Benzophenon	Scortechinones (A and B)	Buah		

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
50	<i>G. smeathmannii</i>	20	13 Xanton	Smeathxanthone A, B, Cheffouxanthone, 1,5 dihy-droxyxanthone, 1,3,5trihydroxyxanthone, bangang xanthone A, smeathxanthone B, & smeathxanthone A, 1,3,5,8-Tetrahydroxy-2-(3-methylbut-2-enyl)-4-(3,7dimethyl-octat-2,6-dienyl)xanthone, cheffouxanthone, smeathxanthone A, smeathxanthone B, and ananixanthone Cheffouxanthone ; smeathxanthones A, and smeathxanthones B Cheffouxanthone ,smeathxanthones A, and smeathxanthones B	Kulit batang	Antibakteri	Foutsa <i>et al.</i> (2015)	
51	<i>G. semseii</i>	11	3 Xanton	Guttiferone I and isoxanthochymol Sensinones A, B, C, Smeathxanthone A, B, Smeathxanthone A & B	Batang	Antibakteri & Antioksidan	Lavaud <i>et al.</i> (2015)	
52	<i>G. solomonensis</i>	5	3 Xanton	Guttiferones O, P, Guttiferone E and Xanthochymol, & Garcinol Garciosaphenone	Kulit batang	Antibakteri & Antioksidan	Pandey <i>et al.</i> (2015)	
53	<i>G. speciosa</i>	9	5 Flavonoid	Friedolanostanes, 3-a-hydroxy-16 a 23-a-epoxy-17,14-friedolanostan-8,14,24-trien-26-oic acid, 3 a,23 a-dihydroxy-8 a 9 a-epoxy-17,14-friedolanostan-15-oxo-24-en-26-oic acid, 3 a 23 alpha-dihydroxy-17,4-friedolanostan-15-oxo-8(14),24-dien-26-oic acid, 3 b 9 adihydroxyylanost-24-en-26-al, 3 b-hydroxy-23-oxo-9, 16-lanostadien-26-oic acid Garcinol, guttiferone A, xanthochymol, & guttiferone E	Kulit batang	Antibakteri	Hemshetkar <i>et al.</i> (2011)	
54	<i>G. spicata</i>	23	4 Xanton	G-B-1, GB-1a, GB-2a, and fukugetin, Fukugicide, GB-1, GB-2, GB-1a, and 6 amenoiflavone Fukugetin and 3-O-methyl fukugetin, Fukuside, Volkenstilavone, spicataside, biflavonoid glycoside, GB-1a, and GB-2a Cambogic acid and mangostin	Buah Daun	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)	
			2 Xanton					

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Number of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
55	<i>G. subelliptica</i>	44	11	Xanton	Garcinialiptone A, garcinialiptone B, Garcinaxanthone C, 1,2,5-trihydroxyxanthone, 2,6dihydroxy-1,5-dimethoxyxanthone, and 1,2dihydroxy-5,6-dimethoxyxanthone, 2,5-Dihydroxy-1-methoxyxanthone, 1-	Batang	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
55	<i>G. subelliptica</i>	44	12	Benzophenon	Omethylsymploxonone, garcinaxanthone E symphoxanthone, and subelliptone A, & 1,6-O-Dimethylsymploxonone 1,4,5,6-Tetrahydroxy-2-(1,1-dimethyl-2-propenyl)7,8-di-(3-methyl-2-butetyl)xanthone, and 1,2,5,6tetrahydroxy-4-(1,1-dimethyl-2-propenyl)-7-(3methyl-2-butetyl)xanthone, subelliptones A and B, Subelliptones C, D, E, F, G, H, & I	Kulit akar	Antinflamasi	Pandey <i>et al.</i> 2015
55	<i>G. subelliptica</i>	44	8	Biflavonoid	Garcinialiptone A, garcinialiptone B, (-)cycloanthochymol, garcinialiptone C, garcinialiptone D, xanthochymol, isoxanthochymol, and cycloanthochymol Podocarpusflavone A, 2R,3S-	Batang	Antiosidant	
56	<i>G. tetranda</i>	10	10	Fenol	5,7,4'',5'',7'',3'',4''-Heptahydroxy flavanone[3-8'] biflavonone	Kulit buah	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
57	<i>G. tetralata</i>	5	5	Xanton	Garcinelliptone A, B, C and D, K, L, M, R, P & garsubellins A	Akar		Javanti & Ersam (2018); Ihsany & Ersam (2018)
					Mangostin, proton, diklorometana, santon terpeniasi	Buah	antiosidant, antibakteri & antimalaria	Guo <i>et al.</i> (2011)

Artikel Penelitian

Mursyidin dan Maulana – **Keragaman dan Kekerabatan Genetik *Garcinia* Berdasarkan Kandungan Senyawa**

No	Spesies (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Com-pounds)	Rincian jumlah senyawa (The Num-ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compounds)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
58	<i>G. wrophylla</i>	6	6	Xanton	isocaldonianthone D, gaudichudione H, 1,7-dihydroxy-3-methoxy-2-(3methyl-2-butenyl)xanthone, 1,5-dihydroxy-3-methoxy-2-(3-methyl-2-but enyl)xanthone, and 1,3,7trihydroxy-2-(3-methyl-2-but enyl)xanthone	Daun [5]	Antibakteri	Khalid <i>et al.</i> (2007)
59	<i>G. vieillardii</i>	13	13	Xanton	Vieillardiianthones B and C, panicaxanthones A, B, 1,6-dihydroxyxanthone, pyranocareubin and 5,6O-dimethyl-2-deprenylrifedaxanthone, 1,6-Dihydroxyxanthone, panicaxanthone A, isocudranianaxanthone A, 2deprenylrifedaxanthone B & 1,4,5trihydroxyxanthone	Kulit batang	Antibakteri	Hay <i>et al.</i> (2008)
60	<i>G. villosiana</i>	6	6	Xanton	Globuxanthone, subelliptone H, subelliptone B, 1,2b-hydroxy-5-des-D-garcigerin A, 1-Omethylglobuxanthone, and symphloanthone	Kulit batang	Antibakteri	Guo <i>et al.</i> (2011)
61	<i>G. wichmannii</i>	7	7	Xanton	1,4,6-Trihydroxy-5-methoxy-7-prenylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7-prenylxanthone, 1,2,5,6-tetrahydroxy-7-geranylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7,8-diprenylxanthone, 1,3,5,6-tetrahydroxy-7,8-triprenylxanthone, 1,3,5,6-tetrahydroxy-4,7,8-prenylapigenin	Daun	Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
62	<i>G. wightii</i>	7	2	Xanton	Cambogic acid & mangostin	Daun	Antimikroba, Antibakteri	Pandey <i>et al.</i> (2015)
			1	Benzophenon	Garcinol	Daun	Antioksidan	
			4		Fukugicide, GB-1, GB-2, GB-1a, and amentoflavone	Daun	Antimflamasi	

No	Species (Species)	Jumlah Senyaw a (Total Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
8	Biflavonoid	8	Jumlah senyaw a (Total Compound)	Volkensiflavone, morelloflavone, GB-1, and GB-1a, 3-8'',-3'',4'',-5'',7'',-7-''hexyahydroxy biflavavone, 3-8'',-4'',-5'',-	Buah	Antiinflamasi	Pandey et al. (2015)
3	Flavonoid	3	Xanton	GB-2a glucoside, GB-2a, and fukugenin GB-1a, GB-2, volkensiflavone, fukugenide, xanthochynoside, and morelloflavone	Akar Kulit batang Daun	Antiinflamasi Antibakteri	
6	Xanton	6		Cambogic acid and mangostin			
2		2		1,4,5,6-Tetrahydroxy-7,8-di(3-methylbut-2-enyl)xanthone, 1,2,6-trihydroxy-5-methoxy-(3- methylebut-2-enyl)xanthone, and 12beta-hydroxy-Dgarigerrin	Batang		
3		3		1,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxyxanthone and 1,5,6trihydroxy-7,8-di(3-methyl-2-butetyl)-60,60-dimethylpyranol(2,3;3,4) xanthone, 1,5,6-Trihydroxy-7-(3-methyl-2-butetyl)-8-(3hydroxy-3-methylbutyl)furanol(2',3';3,4) xanthone, 1,5,6-trihydroxy-7-(3-methyl-2-butetyl)-8-(3hydroxy-3-methylbutyl)-6',6'',-			Pandey et al. (2015)
63	<i>G. xanthochymus</i>	39	Xanton	dimeethylpyranol(2,3';3,4) xanthone, 1,5,6-trihydroxy-7-(3- methylebut-2-enyl)-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-5-(hydroxy-1-methyljethyl)-4',5'-dihydrofuranol(2',3;3,4) xanthone, 1,2,5,4'-tetrahydroxy-4-(1,1-dimethylallyl)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-4',5'-dihydrofuranol(2',3';6,7)xanthone, 1,3,5,6tetrahydroxy-7-geranyl xanthone, and 1,4-dihydroxy-6',6'-dimethylpyranol(2',3';5,6) xanthone, 1,7-dihydroxyxanthone and 1,5-dihydroxyxanthone	Kulit buah	Antibakteri	
7		10		1,4,6-Trihydroxy-5-methoxy-7-prenylxanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7-prenylxanthone, 1,2,5,6tetrahydroxy-7-geranyl xanthone, 1,4,5,6-tetrahydroxy-7,8-diprenylxanthone, 1,3,5,6tetrahydroxy-4,7,8-triprenylxanthone, garcinaxanthone E, and 6-prenylapigenin		Antibakteri	Pandey et al. (2015)

Artikel Penelitian

Mursyidin dan Maulana – Keragaman dan Kekerabatan Genetik *Garcinia* Berdasarkan Kandungan Senyawa

No	Species (Species)	Jumlah Senyawa (Total Compound)	Rincian jumlah senyawa (The Num- ber of Each Compound)	Golongan Senyawa (Group of Compound)	Nama Senyawa (Name of Compound)	Organ (Plant Organs)	Aktivitas (Activity)	Referensi (References)
64	<i>G. xiphuanhamae</i> nsis	16	14	Xanton	Bannaxanthone H, 1,3,5,6-tetrahydroxy-2-(3methylbut-2-enyl)xanthone, bannaxanthone F, garcinone C, 1,3,6,7-tetrahydroxy-8-(3-methylbut2-enyl)xanthone, bannaxanthone G, bannaxanthone B, γ -anangostin, garcinone E, bannaxanthone E, allanxanthone C, bannaxanthone D, 1,3,5,6tetrahydroxy-7-(3-methylbut-2-enyl)xanthone, xanthone V1a, and nigrolinexanthone V	Ranting	Antibakteri, Antiinflamasi, & Sitosoksik	Chen et al. (2010)
			2	Benzopheno n	Gutiferone E and xanthochymol	Ranting		

Keragaman dan kekerabatan genetik Garcinia berdasarkan kandungan senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya: Kajian in silico

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	www.sciencegate.app Internet Source	4%
2	accessapps.amdi.usm.my Internet Source	3%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%
4	Ahmad Zaelani, Wulan S. Kurniajati, Herlina Herlina, Diyah Martanti, Fajarudin Ahmad. "ANALISIS GAMBAR DIGITAL UNTUK SERANGAN PENYAKIT LAYU FUSARIUM DI PISANG MENGGUNAKAN IMAGEJ", BERITA BIOLOGI, 2020 Publication	1 %
5	docobook.com Internet Source	1 %
6	baadalsg.inflibnet.ac.in Internet Source	1 %
	profiles.uonbi.ac.ke	

7

Internet Source

1 %

8

www.tandfonline.com

1 %

9

dokumen.pub

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On